

복압성 요실금(SUI)은 기침, 재채기, 웃음, 무거운 물건 들기, 운동 등으로 방광에 갑자기 압력이 가해질 때 소변이 새는 질환입니다. 여성에서는 출산이나 폐경 이후 요도 아래의 지지 구조가 약해지면서 발생합니다. 매우 흔한 질환이며, 간단한 운동부터 효과적인 수술까지 다양한 치료법이 있습니다.

이 질환에 대하여

요도(소변이 흐르는 관)는 기침이나 힘을 줄 때 골반저 지지 구조 덕분에 평소 닫혀 있습니다. 이 지지 구조가 약해지면 복압이 갑자기 높아질 때 소변이 새어 나옵니다. 핵심 증상은 **신체 활동 중 소변이 새는 것**으로, 갑작스러운 요의와 함께 새는 절박성 요실금과는 다릅니다. 두 가지가 함께 있으면 **혼합성 요실금**이라고 합니다.

원인

- 임신과 출산 (가장 흔한 원인)
- 폐경과 노화
- 만성 기침, 변비, 무거운 물건을 자주 드는 경우
- 과체중, 이전 골반 수술

용어 설명

복압성 요실금

기침, 들기, 운동 등 압력이 생길 때 소변이 새는 것.

요도

소변이 몸 밖으로 나오는 관.

골반저

방광과 요도를 지지하는 근육군.

케겔 운동

골반저근을 수축하여 지지력을 키우는 운동.

혼합성 요실금

복압성 요실금과 절박성 요실금이 함께 있는 경우.

페서리 / 삽입물

소변 누출을 줄이기 위해 질 안에 삽입하는 지지 장치.

요도 주위 충전제 주사

요도를 밀봉하도록 돕는 외래 주사 시술.

중부요도 슬링

수술 중 요도 아래에 넣는 작은 메쉬 지지물.

반드시 수술해야 하나요? 그렇지 않습니다. 많은 분들이 골반저근 운동과 생활 습관 개선만으로 호전됩니다. 지지 장치를 사용하는 방법도 있습니다. 더 지속적인 효과를 원하실 때는 슬링 수술이 매우 효과적이지만, 선택은 환자분께 있으며 간단한 방법부터 시작할 수 있습니다.

진단 방법

- 언제 소변이 새는지 문진과 진찰 (기침 테스트 포함)
- 감염을 배제하는 **소변 검사**, 방광 잔뇨 확인
- 수술 전 필요한 경우 요역동학 검사

치료 방법 (단계별)

- 1 골반저근 운동(케겔) 및 물리치료, 체중 감량, 기침·변비 치료.
- 2 지지 장치 — 페서리 또는 일반의약품 삽입물.
- 3 요도 주위 충전제 주사 — 요도 밑봉을 돕는 외래 주사.
- 4 수술 — 지속적인 교정을 위한 **중부요도 슬링**(또는 자가 근막 슬링). 각 수술마다 별도 안내문이 있습니다.

생활 관리

- 기침, 재채기, 무거운 것을 들기 **직전에 골반저를 수축**하세요 (“조이기 습관”).
- 골반저근 운동을 매일 하세요 — 효과는 6-12주 후 나타납니다.
- 변비와 만성 기침을 치료하면 복압을 줄일 수 있습니다.

다음 증상이 있으면 의료진에게 연락하세요:

- 배뇨 시 작열감, 절박뇨, 또는 **혈뇨** (감염 가능성)
- **강한 요의**와 함께 소변이 새는 경우 — 치료가 달라질 수 있습니다
- 방광이 완전히 비워지지 않는 느낌

기억할 세 가지

1. 복압성 요실금은 요도 지지 구조 약화로 압력 시 소변이 새는 것으로, 매우 흔하고 충분히 치료할 수 있습니다.
2. 치료는 골반저근 운동·지지 장치에서 주사 시술, 슬링 수술까지 단계적으로 선택할 수 있습니다.
3. 운동은 효과가 나타나기까지 몇 주가 걸립니다. 기침·들기 전에 조이는 습관을 들이세요. 수술은 선택 사항입니다.