

테스토스테론 보충요법(TRT) (남성)

환자 안내문 · 증상이 동반된 확인된 저테스토스테론 치료

WARWIKI

테스토스테론 보충요법(TRT)은 혈액검사로 확인된 저테스토스테론과 증상이 함께 있는 남성을 치료합니다 — 성욕 저하, 피로, 우울감, 근력 감소, 발기력 저하 등이 해당됩니다. 겔, 주사, 패치, 또는 삽입형 펠릿을 통해 테스토스테론을 정상 범위로 회복시킵니다. 노화 방지 치료가 아니며, 정상 수치인 경우에는 사용하지 않습니다.

작용 원리 & 대상

저테스토스테론(성선기능저하증)은 **오전에 두 번 실시한 혈액검사**와 증상이 모두 있을 때 진단됩니다 — 수치 하나만으로는 충분하지 않습니다. 두 조건이 모두 충족되면, TRT는 수주에서 수개월에 걸쳐 활력, 성욕, 기분, 근력을 개선할 수 있습니다.

투여 형태

- **겔 또는 액제** — 매일 도포(여성 및 어린이에게 피부 접촉 전이 주의 필요).
- **주사** — 1-2주 간격, 또는 장기작용형은 약 10주 간격.
- **패치, 삽입형 펠릿**(3-6개월마다), 또는 비강용 겔.

용어 설명

테스토스테론

주요 남성 호르몬으로, 성욕·활력·기분·근력에 영향을 미칩니다.

성선기능저하증

확인된 저테스토스테론 상태.

헤마토크릿

TRT로 상승할 수 있는 혈구 수치 — 모니터링합니다.

PSA

치료 전후에 확인하는 전립선 혈액검사.

생식 능력(가임력)

TRT는 정자 생성을 감소시킵니다 — 자녀 계획이 있다면 반드시 알리세요.

겔 전이

겔이 타인에게 묻는 것 — 도포 부위를 가리고 손을 씻으세요.

자녀 계획이 있으신가요? 먼저 의료진에게 알려주세요. TRT는 **정자 생성을 감소시켜 불임을 유발할 수 있으며** — 그 영향이 지속될 수도 있습니다. 자녀 계획이 있다면, 정자를 보호하면서 테스토스테론을 높이는 다른 치료법이 있습니다. 이 사항을 논의하지 않고 TRT를 시작하지 마세요.

모니터링(추적검사) — 중요

TRT는 정기적인 외래 방문과 혈액검사가 필요합니다:

- **테스토스테론 수치** — 정상 범위 유지를 확인합니다.
- **헤마토크릿** — TRT로 혈액이 진해질 수 있으며, 수치가 너무 높아지면 용량을 조절하거나 잠시 중단합니다.
- **PSA / 전립선** — 치료 전후에 확인하며, 치료받지 않은 전립선암이 있으면 TRT를 시작하지 않습니다.

안전한 사용법

- **겔:** 지시대로 도포 후 건조시키고, 부위를 가리고, 손을 씻으세요 — 여성·어린이에게 전이되지 않도록 주의.
- 용량을 임의로 바꾸지 말고, 모든 혈액검사 일정을 지키세요.
- 심장 질환 또는 **수면무호흡증**이 있으면 의료진에게 알려주세요(TRT가 악화시킬 수 있습니다).

흔한 영향

- 여드름, 피부 기름기, 부종
- 유방 압통, 고환 위축, 생식 능력 감소
- 적혈구 증가(모니터링 또는 채혈이 필요할 수 있음)

다음 증상이 있으면 의료진에게 연락하세요:

- **홍통, 다리 부기/통증, 또는 호흡 곤란**
- 심한 두통, 시력 변화, 또는 혈액 농축 증상
- 새로운 배뇨 장애 또는 전립선 관련 이상

기억할 세 가지

1. TRT는 **확인된 저테스토스테론과 증상이 함께** 있는 남성을 위한 것입니다 — 정상 수치나 노화 방지 목적에는 사용하지 않습니다.
2. **생식 능력(가임력)을 감소시킵니다** — 자녀 계획이 있다면 시작 전에 반드시 의료진과 상의하세요.
3. 테스토스테론 수치, 혈구 수치, 전립선을 지속적으로 모니터링해야 합니다. 겔은 타인에게 전이되지 않도록 주의하세요.