

요도 주위 충전제 주사(urethral bulking)는 복잡성 요실금 — 기침, 웃음, 또는 활동 시 소변이 새는 증상 — 에 대한 최소 침습 치료입니다. 부드러운 충전제를 요도 주위에 주입하여 요도가 더 잘 닫히도록 돕고, 복압이 높아질 때 소변이 새지 않게 합니다. 절개 없이 빠르게 시행할 수 있으며, 슬링 수술의 대안 또는 사전 단계로 선택할 수 있습니다.

작용 원리

충전제를 요도 벽 여러 곳에 주입하여 **요도를 두툼하게** 만들면 요도가 더 완전히 닫힙니다. 요도가 잘 닫히면 복압이 갑자기 높아져도 소변이 새는 것을 막을 수 있습니다.

나에게 적합한 시술인가요?

- 수술 없이 **빠르고 위험 부담이 낮은** 치료를 원하는 경우 좋은 선택입니다.
- 슬링 수술을 받을 수 없거나 피하고 싶은 경우에 도움이 됩니다.
- 수술 여부를 결정하기 전 **중간 단계**로 활용할 수 있습니다.

일반적으로 슬링보다 **지속 효과가 짧고** 요실금을 완전히 치료하지 못할 수 있지만, 효과가 줄어들면 **반복 시술**이 가능합니다.

용어 설명

복잡성 요실금

기침, 웃음, 물건 들기, 운동 등 복압 상승 시 소변이 새는 증상.

충전제

요도 벽을 두툼하게 만들기 위해 주입하는 부드러운 물질.

요도

방광에서 소변을 몸 밖으로 내보내는 관.

방광경

주사를 안내하는 데 사용하는 가느다란 카메라 기기.

슬링

요도 아래에 지지대를 삽입하는 수술적 치료 — 더 오래 지속됩니다.

아픈가요? 대부분 국소 마취 후 외래에서 시행하며, 약 10~15분 소요됩니다. 대부분의 환자는 가벼운 압박감만 느끼고 당일 귀가하여 바로 일상생활을 재개할 수 있습니다. 시술 후 잠깐 따가운 느낌이 드는 것은 흔한 증상입니다.

준비 방법

- 시술 전 감염 여부 확인을 위한 **소변 검사**를 시행합니다.
- **혈액 희석제(항혈전제)** 복용 여부 및 알레르기를 의료진에게 알려 주세요.
- 특별한 사전 준비가 없으며, 대부분 직접 운전하여 귀가할 수 있습니다.

시술 과정

- 1 마취 약을 도포합니다.
- 2 가느다란 **방광경**을 삽입하여 요도를 확인합니다.
- 3 요도 주위 여러 곳에 충전제를 주입합니다.
- 4 방광경을 제거하고, 귀가 전 소변을 보도록 합니다.

시술 후

- 하루 이틀간 가벼운 따가움, 절박뇨, 혈뇨가 나타날 수 있으며 정상입니다.
- 시술 직후 일시적으로 **소변 보기가 어려울** 수 있으나 보통 곧 회복됩니다.

다음 증상이 있으면 의료진에게 연락하세요:

- 시술 후 **소변을 전혀 볼 수 없는** 경우
- 발열 또는 오한(감염 의심)
- 심한 출혈 또는 통증 악화

알아 두세요

- 시술 효과는 수 주 이내에 나타납니다.
- 시간이 지나 요실금이 재발하면 주사를 **반복**할 수 있습니다.
- 더 오래 지속되는 치료를 원한다면 나중에 슬링 수술도 선택할 수 있습니다.

기억할 세 가지

1. 요도 주위 충전제 주사는 절개 없이 빠르게 시행하는 주사 시술로, 요도를 두툼하게 하여 복잡성 요실금을 줄입니다.
2. 슬링보다 지속 효과는 짧고 요실금을 완전히 없애지 못할 수 있지만, 위험 부담이 낮고 반복 시술이 가능합니다.
3. 회복이 빠릅니다. 소변을 볼 수 없거나 발열이 생기면 즉시 의료진에게 연락하세요.