

요도성형술 (요도 복원 수술)

환자 안내문 · 요도 협착을 복원하는 수술

WARWIKI

요도성형술은 좁아지거나 흉터가 생긴 요도를 복원하는 수술입니다. 요도는 소변이 몸 밖으로 나오는 관입니다. 이 협착 부위가 소변 흐름을 막으며, 요도성형술은 요도를 정상 너비로 재건하는 가장 효과적이고 지속적인 치료법입니다.

이 수술에 대하여

요도 협착은 요도에 흉터가 생겨 좁아진 부위로, 방광을 비우기 어렵게 만듭니다. 단순히 늘리거나 절개하는 방법은 재발이 잦지만, 요도성형술은 요도를 **재건**하여 성공률 **85-95%**의 지속적인 효과를 제공합니다. 수술 방법은 협착 위치와 길이에 따라 달라집니다:

- **절개 부위**는 **음경**, 음낭과 항문 사이의 회음부, 또는 둘 다 — 협착 위치에 따라 결정됩니다.
- **짧은 협착**은 **제거 후 건강한 양 끝을 봉합**합니다.
- **긴 협착**은 **이식편으로 확장**합니다 — 주로 협부(볼 안쪽) 점막을 사용합니다.

담당 집도이가 귀하의 협착에 맞는 방법을 설명해 드립니다.

안전한가요?

요도성형술은 검증된 고효율 수술입니다. 대부분의 환자는 수술 후 요도가 영구적으로 개통됩니다. 모든 수술과 마찬가지로 출혈, 감염, 협착 재발 등의 위험이 있으나 재발 시 대개 재치료가 가능합니다. 발기나 사정에 대한 영향은 드물고 대부분 일시적입니다.

용어 설명

요도

소변이 몸 밖으로 나오는 관.

요도 협착

요도에 흉터가 생겨 좁아진 부위로 소변 흐름을 막습니다.

요도성형술

협착 부위를 재건하여 요도를 정상 너비로 복원하는 수술.

이식편

요도를 넓히기 위해 사용하는 자신의 조직 조각(주로 협부 점막).

회음부

음낭과 항문 사이의 부위로, 흔히 절개가 이루어집니다.

도뇨관

봉합 부위가 아무는 동안 약 1-4주간 요도에 유치되는 부드러운 관.

요도 X선 검사

도뇨관 제거 전 봉합 부위 회복 여부를 확인하는 X선 검사.

전신마취

수술 중 의식을 없애고 통증을 차단하는 마취.

아픈가요? 수술은 전신마취 또는 척추마취 하에 진행되므로 수술 중에는 통증이 없습니다. 수술 후에는 절개 부위(음경 및/또는 회음부)에 2주 정도 통증·부기·멍이 생길 수 있으며, 냉찜질·음낭 지지대·진통제가 도움이 됩니다. 수술 후 도뇨관이 삽입된 채로 깨어나게 됩니다. 수술 시간은 수술 방법에 따라 다르며 대개 2~4시간입니다.

준비 방법 (수술 전)

- **전신마취 또는 척추마취**로 진행됩니다 — 금식 및 약 복용 중단(항응고제 포함) 지침을 따르십시오.
- **소변 검사**로 감염 여부를 확인합니다 — 감염이 있으면 먼저 치료해야 합니다.
- **금연하십시오** — 흡연은 회복을 늦춥니다. 협부 점막 이식편 사용 가능성이 있다면 구강 위생 관리 및 스케일링이 권장될 수 있습니다.
- 수술 후 **약 1~4주간 도뇨관**이 유지됩니다. 귀가 시 보호자 동반을 준비하십시오.

다음 사항은 **사전에** 의료진에게 알려주세요:

- 항응고제 복용 중이거나 현재 소변·피부 감염이 있는 경우
- 이전에 요도 수술, 방사선 치료, 또는 경화성 태선 등 피부 질환이 있었던 경우

수술 과정

- 1 마취 후 항생제를 투여합니다. 전신마취 또는 척추마취로 수술 중 통증이 없습니다.
- 2 집도기가 협착 부위(음경, 회음부, 또는 양쪽 모두)를 절개하여 흉터 부위를 노출합니다.
- 3 협착 부위를 복원합니다 — 제거 후 양 끝을 봉합하거나, 이식편으로 확장합니다.
- 4 봉합 부위 보호를 위해 **도뇨관**을 삽입한 후 절개 부위를 봉합합니다.

수술 후

- **도뇨관**을 삽입한 채 퇴원하며, 보통 **약 1~4주** 유지합니다. 의료진이 관리법을 알려드립니다 — 잡아당기지 마십시오.
- 초기에는 부기·멍과 도뇨관 주변의 **혈뇨**가 나타날 수 있으며 정상입니다.
- 봉합 부위 회복을 위해 수 주간(대개 약 6주) **무거운 것 들기, 힘주기, 자전거 타기, 성관계를 삼가십시오**.
- 도뇨관 제거 전에 대개 **요도 X선 검사**를 통해 회복 여부를 확인합니다.

다음 증상이 있으면 의료진에게 연락하세요:

- 도뇨관이 빠지거나 막히거나 소변이 나오지 않는 경우
- 발열·오한, 또는 절개 부위의 발적·통증·분비물이 심해지는 경우
- 심한 출혈, 또는 도뇨관 제거 후 **소변을 볼 수 없는 경우**

기억할 세 가지

1. 요도성형술은 협착된 요도를 재건하는 가장 지속적인 치료법입니다. 절개는 음경, 회음부, 또는 양쪽 모두에 할 수 있으며, 이식편(주로 협부 점막)이 사용될 수 있습니다.
2. 수술 전 금식·약 복용 중단 지침을 따르고, 감염을 먼저 치료하며, 금연하고, 도뇨관 유지(약 1~4주)를 준비하십시오.
3. 의료진이 제거할 때까지 도뇨관을 유지하고(대개 X선 확인 후), 수 주간 무거운 것 들기·힘주기·성관계를 삼가하십시오. 도뇨관 막힘, 발열, 또는 소변을 볼 수 없는 경우 즉시 연락하십시오.