

요역동학 검사(uroynamics)는 방광이 소변을 얼마나 잘 저장하고 배출하는지를 측정하는 일련의 검사입니다. 가는 부드러운 도뇨관(카테터)을 이용해 방광을 천천히 채우고 비우는 동안 압력을 측정합니다. 검사실에서 환자의 증상을 재현하여 의료진이 정확한 원인을 파악하고 적절한 치료를 계획하는 것이 목적입니다.

이 검사에 대하여

요역동학 검사는 단일 검사가 아니라 여러 검사를 함께 진행합니다. 필요에 따라 다음이 포함될 수 있습니다:

- **요류 검사** — 전용 변기에 소변을 보아 요속과 패턴을 측정하고, 배뇨 후 잔뇨량을 확인합니다.
- **충만기 검사** — 방광을 천천히 채우면서 압력을 측정하고 느끼는 감각을 보고합니다.
- **압력-요류 검사** — 소변을 보는 동안 방광 압력을 측정합니다.
- 경우에 따라 동시에 **X선 촬영**을 병행합니다(영상 요역동학 검사).

두 개의 가는 도뇨관을 사용합니다. 하나는 요도를 통해 방광 내부에, 또 하나는 직장(또는 질)에 삽입하여 복압을 측정함으로써 방광 압력과 복압을 구별합니다.

안전한가요?

예. 요역동학 검사는 위험도가 낮은 상호 참여형 검사입니다. 주요 위험은 도뇨관 삽입으로 인한 일시적인 작열감과 요로감염(UTI) 가능성입니다. 항생제가 처방될 수 있습니다. 수술이 없고 회복 시간도 필요하지 않습니다.

용어 설명

요역동학 검사

방광이 소변을 저장하고 배출하는 방식을 측정하는 일련의 검사.

방광

소변을 배뇨 전까지 저장하는 근육성 주머니.

도뇨관(카테터)

방광을 채우고 압력을 측정하는 데 사용하는 가늘고 부드러운 관.

충만기 검사

방광이 서서히 채워지는 동안 압력과 감각을 측정하는 검사.

압력-요류 검사

배뇨 중 압력을 측정하여 방광 배출 기능을 평가하는 검사.

요류 검사

소변 줄기의 속도와 패턴을 측정하는 검사.

영상 요역동학 검사

동일한 검사에 X선 촬영을 추가하여 세부 정보를 얻는 검사.

배뇨 후 잔뇨량

소변을 본 후 방광에 남아 있는 소변의 양.

아픈가요? 대부분의 환자는 도뇨관으로 인한 통증보다 압박감과 약간의 불편함을 느낍니다. 검사 중 기침을 하거나 자세를 바꾸고 소변을 보도록 요청받을 수 있으며, 의료진이 가리개를 제공하고 환자의 속도에 맞추어 진행합니다. 보통 30-60분이 소요되며, 검사 후 바로 귀가할 수 있습니다.

준비 방법 (검사 전)

- **적당히 찬 방광 상태**로 내원하도록 안내받을 수 있습니다 — 제공된 지침을 따르세요.
- **평소 복용약**은 그대로 드시되, **방광 관련 약**을 미리 중단해야 하는지 담당 의료진에게 확인하세요. 해당 약이 검사 결과에 영향을 줄 수 있습니다.
- 진정(수면) 처치가 필요 없으므로 보통 **직접 운전하여 귀가**할 수 있습니다.

다음에 해당하면 **미리 의료진에게 알려주세요**:

- **요로감염 증상**이 있는 경우 (작열감, 발열, 흐리거나 강한 냄새의 소변) — 활동성 감염이 있으면 검사가 연기될 수 있습니다
- 항혈전제를 복용 중이거나 알레르기(라텍스 포함)가 있는 경우

검사 전 감염 여부 확인을 위해 **소변 검체** 제출을 요청받을 수 있습니다.

진행 과정

- 1 전용 번기에 소변을 보아 요속과 패턴을 측정하고, 의료진이 잔뇨량을 확인합니다.
- 2 가는 도뇨관을 부드럽게 삽입합니다 — 하나는 방광에, 작은 것 하나는 직장 또는 질에 넣습니다.
- 3 방광을 천천히 채우는 동안 처음 느껴지는 감각과 강한 요의를 보고하며, 기침을 하거나 자세를 바꾸도록 요청받을 수 있습니다.
- 4 소변을 보는 동안 압력이 기록되고, 이후 도뇨관을 제거합니다.

후

- 검사 후 **즉시 일상 활동**으로 돌아갈 수 있습니다.
- 하루 정도 소변 볼 때 **가벼운 작열감**이 있을 수 있습니다. 물을 충분히 마시면 증상이 완화됩니다.
- 소변이 잠시 **분홍빛**을 띠 수 있습니다. 흔히 나타나는 현상이며 보통 하루 이내에 사라집니다.

다음 증상이 있으면 의료진에게 연락하세요:

- 발열이나 오한
- 소변 보기 어렵거나 전혀 나오지 않는 경우
- 심한 출혈 또는 소변에 혈전이 있는 경우
- 통증이 점점 심해지는 경우

기억할 세 가지

1. 요역동학 검사는 방광이 채워지고 비워지는 방식을 측정하여 요실금, 절박뇨, 배뇨 장애의 원인을 파악하고 적절한 치료를 계획하기 위한 검사입니다.
2. 준비 사항은 간단합니다. 방광 관련 약을 중단해야 하는지 확인하고, 요청 시 적당히 찬 방광 상태로 내원하며, 감염 증상이 있으면 미리 알려주세요.
3. 통증보다 압박감을 느끼는 경우가 많으며 검사 후 바로 귀가할 수 있습니다. 하루 정도 가벼운 작열감이나 분홍빛 소변은 정상입니다 — 물을 충분히 마시고, 발열·심한 출혈·배뇨 곤란이 있으면 연락하세요.