

질 에스트로겐은 질 안에 직접 삽입하는 저용량 에스트로겐 — 크림, 정제 또는 링 형태 — 으로, 폐경 후 에스트로겐 감소로 인한 질 건조, 자극, 성교통, 요로 증상을 치료합니다. 국소적으로 작용하기 때문에 혈류로 흡수되는 양이 매우 적어 대부분의 환자에게 안전합니다.

치료 대상 증상

폐경 후 에스트로겐이 감소하면 질과 요도 조직이 얇아지고 건조해지는데, 이를 **폐경기 비뇨생식기 증후군(GSM)**이라고 합니다. 질 에스트로겐은 해당 조직을 회복시키며 다음과 같은 효과가 있습니다:

- 건조, 작열감, 가려움 및 성교통 완화
- 요로 절박뇨 및 빈뇨 감소
- 반복성 요로감염(UTI) 위험 감소

안전한가요?

대부분의 경우 안전합니다. 질 에스트로겐은 **저용량 국소 치료**로, 안면홍조에 사용하는 에스트로겐 알약이나 패치와는 달리 체내 흡수량이 매우 적습니다. 유방암이나 기타 호르몬 민감성 암 병력이 있어도 사용 가능한 경우가 많으니, 의료진과 함께 결정하세요.

용어 설명

GSM

폐경기 비뇨생식기 증후군 — 에스트로겐 감소로 인한 건조, 조직 위축, 요로 증상.

질 에스트로겐

질 내 삽입하는 저용량 에스트로겐 (크림, 정제 또는 링).

국소 vs. 전신

국소는 삽입 부위에만 작용하며, 전신(알약/패치)은 온몸에 작용합니다.

유지 용량

초기 2주 후의 낮은 지속 투여 용량.

반복성 요로감염

질 에스트로겐이 예방에 도움이 되는 반복적 방광 감염.

보습제 / 윤활제

호르몬 없이 함께 사용할 수 있는 비호르몬 제품.

효과가 나타나기까지 얼마나 걸리나요? 많은 분들이 수 주 내에 증상 호전을 느끼며, 8~12주면 충분한 효과가 나타납니다. 사용을 지속하는 동안에만 효과가 유지되므로 장기 관리가 필요하며, 중단 시 증상이 재발할 수 있습니다.

사용 방법

- 1 **초기 단계:** 대부분의 제형은 조직 회복을 위해 **약 2주간 매일 밤** 사용합니다.
- 2 **유지 단계:** 이후 **주 2회**로 줄입니다 (링은 3개월마다 교체).
- 3 **취침 전에** 사용하면 자리를 잡기 쉬우며, 사용 전후 손을 씻으세요.
- 4 장기간 지속 사용하세요 — 안전하며 효과는 꾸준한 사용에 달려 있습니다.

제형 종류

- 크림 — 도포기로 용량 조절이 유연함
- 정제 / 삽입제 — 간편하고 미리 계량됨
- 링 — 3개월마다 교체, 관리가 편리함

알아두면 좋은 점

- 추가적인 편안함을 위해 비호르몬 **보습제나 윤활제**를 함께 사용할 수 있습니다.
- 초기에 약간의 분비물이나 소량 출혈이 있을 수 있으나 보통 금방 가라앉습니다.
- 골반저근 치료 및 다른 방광 치료와 병행하면 효과적입니다.

다음 증상이 있으면 의료진에게 연락하세요:

- 폐경 후 **질 출혈** — 반드시 확인이 필요합니다
- 새로운 유방 종괴 또는 이상 증상
- 호전되지 않고 악화되는 자극 증상

기억할 세 가지

1. 질 에스트로겐은 폐경 관련 건조, 성교통, 요로 증상을 위한 저용량 국소 치료로, 체내 흡수량이 매우 적습니다.
2. 약 2주간 매일 밤 사용 후 주 2회로 유지하세요 (또는 링은 3개월마다 교체); 효과는 꾸준한 사용에 달려 있습니다.
3. 대부분의 환자에게 안전합니다 — 암 병력이 있는 경우 의료진과 상담하세요. 폐경 후 출혈은 반드시 보고하세요.