

# 질식 자궁절제술 (골반장기탈출증)

WARWIKI

환자 안내문 · 질을 통해 자궁을 제거하고 질 상부를 고정하는 수술

골반장기탈출증(pelvic organ prolapse)으로 자궁이 내려앉은 경우, 질식 자궁절제술이 한 가지 선택지입니다. 이는 복부 절개 없이 질을 통해 자궁을 완전히 제거하는 수술입니다. 수술 후 지지력을 확보하기 위해 거의 항상 질 상부 고정술(및 추가 교정)을 함께 시행합니다.

## 이 수술에 대하여

자궁을 질을 통해 분리·제거한 후, 질 상부를 골반 내 튼튼한 인대에 고정하여 이후 탈출이 생기지 않도록 합니다. 검사 결과에 따라 질 전벽 또는 후벽 교정을 추가할 수 있습니다. 질식 수술은 복식 수술보다 통증이 적고 회복이 빠릅니다.

## 알아둘 사항

- 자궁을 제거하면 월경이 끊기고 임신이 불가능해집니다.
- 탈출이 주로 자궁에 국한되어 있고 자궁을 보존하고 싶다면, 자궁 보존 고정술(자궁고정술)을 고려할 수 있습니다 — 집도의에게 문의하세요.
- 필요한 경우 요실금 수술을 함께 시행할 수 있습니다.

### 용어 설명

#### 자궁절제술

자궁을 제거하는 수술.

#### 질식(vaginal route)

복부 절개 없이 질을 통해 시행.

#### 질 상부 고정술(vault suspension)

질 상부를 인대에 다시 고정하여 지지력을 유지.

#### 자궁고정술(hysteropexy)

자궁을 제거하지 않고 고정하는 보존적 대안.

#### 탈출증(prolapse)

골반 장기가 내려앉아 돌출감·압박감을 유발하는 상태.

#### 질 패킹(vaginal packing)

수술 후 치유를 돕기 위해 일시적으로 넣는 거즈.

**아픈가요?** 마취 하에 진행되므로 수술 중에는 전혀 느끼지 못합니다. 복부 절개가 없어 복식 수술보다 회복이 수월하며, 대부분 당일 또는 하룻밤 입원 후 귀가합니다. 수술 후 가벼운~중간 정도의 불편감이 있을 수 있습니다.

## 준비 방법

- **마취 안내**에 따라 금식하고 지시된 혈액 희석제를 중단하세요.
- 수술 전 평가를 받고, 추가 교정이나 요실금 수술 여부를 의료진과 상의하세요.
- 금연하고, 귀가를 도와줄 사람과 집에서 도움을 줄 사람을 미리 준비하세요.

## 진행 과정

- 1 마취 후 항생제를 투여합니다.
- 2 자궁을 분리하여 **질을 통해** 제거합니다.
- 3 질 상부를 인대에 **고정**하고, 계획된 추가 교정을 시행합니다.
- 4 도뇨관과 필요시 질 패킹을 일시적으로 삽입합니다.

## 수술 후

- 질 상부가 아무는 동안 수 주간 가벼운 출혈·분비물이 정상입니다.
- **약 6주간 무거운 것 들기, 힘주기, 성관계를 삼가세요.**
- 변비를 피해 변이 부드럽도록 하고, 충분히 쉬면서 서서히 활동을 늘리세요.

### 다음 증상이 있으면 의료진에게 연락하세요:

- 발열 또는 오한, 심한 출혈
- **소변을 볼 수 없거나** 골반·복부 통증이 악화되는 경우
- 약취 나는 분비물, 또는 질에서 무언가 나오는 느낌

## 기억할 세 가지

1. 질식 자궁절제술은 복부 절개 없이 질을 통해 자궁을 제거하며, 질 상부 고정술을 함께 시행합니다.
2. 수술 후 월경이 끊기고 임신이 불가능해집니다. 자궁을 보존하고 싶다면 자궁고정술을 문의하세요.
3. 약 6주간 무거운 것 들기와 성관계를 삼가세요. 가벼운 출혈은 정상이나, 발열·심한 출혈·배뇨 곤란 시 즉시 연락하세요.