

질식 탈출증 교정술 중 일부는 약해진 조직을 보강하기 위해 이식편을 사용합니다. 이식편은 생물학적 이식편이거나, 경우에 따라 메시일 수 있습니다. 이 안내문은 두 가지 선택지를 솔직하게 설명하며, 질내 메시의 안전 이력도 포함합니다. 집도의와 함께 충분히 상의하여 결정하시기 바랍니다.

이 수술에 대하여

질 절개를 통해 약해진 벽을 복원하고, 이식편을 덧대어 강도를 높이고 재발 위험을 낮춥니다. 사용되는 재료는 다음과 같습니다.

- **생물학적 이식편** — 기증된 인체 또는 동물 조직으로 만들며, 자신의 조직이 아무는 과정에서 서서히 흡수됩니다.
- **합성 메시** — 영구적인 재료로, **선별적으로** 사용되며 충분한 설명이 필요합니다.

중요한 안전 정보

탈출증 교정을 위한 **질내 합성 메시**는 **FDA 경고**의 대상이 되었으며, 메시 노출 및 통증 등의 위험으로 인해 현재 미국에서는 이 용도로 판매되지 않습니다. 현재 탈출증은 대부분 **자신의(자가) 조직** 또는 생물학적 이식편으로 교정하며, 복부 메시(예: 천골질고정술)는 별도의 잘 검증된 선택지입니다. 집도의가 사용할 재료와 그 이유를 자세히 설명해 드릴 것입니다.

용어 설명

탈출증

골반 장기가 내려앉아 돌출감이나 압박감을 유발하는 상태.

이식편

교정 중 덧대는 지지 재료.

생물학적 이식편

시간이 지나며 체내에 흡수되는 조직 기반 재료.

합성 메시

영구적 재료; 질내 탈출증 교정 사용이 제한됨.

자가 조직 교정

이식편 없이 본인 조직만으로 시행하는 교정.

메시 노출

메시 일부가 보이거나 만져지는 상태; 통증이나 분비물을 유발할 수 있음.

메시가 걱정되시나요? 당연한 질문입니다. 경고 대상이 된 문제는 **탈출증 교정을 위한 질내 합성 메시**에 국한됩니다. 자가 조직 교정, 생물학적 이식편, 복부 메시는 각각 다른 안전성 프로파일을 가지며 충분히 연구되어 있습니다. 중요한 것은 집도의가 어떤 재료를 사용할 계획이며 그 이유가 무엇인지 정확히 이해하는 것입니다 — 꼭 물어보세요.

집도의에게 할 질문

- 어떤 **재료**를 사용할 예정인가요 — 자가 조직, 생물학적 이식편, 합성 메시 중 어느 것이며 왜 저에게 적합한가요?
- 메시 노출이나 성교통 등 **구체적인 위험**은 무엇인가요?
- 대안**(자가 조직 교정, 천골질고정술, 페서리)은 무엇인가요?
- 각 선택지에서 탈출증이 **재발할 가능성**은 얼마나 되나요?

준비 방법

- 마취 안내**를 따르세요(금식, 혈전 예방제 복용 중단 등).
- 금연하고, 귀가를 도와줄 사람과 집에서 도움을 줄 사람을 미리 준비하세요.
- 수 주간 가벼운 활동과 골반 안정을 유지할 계획을 세우세요.

수술 후

- 수 주간 소량의 출혈이나 분비물은 정상입니다.
- 약 6주간 무거운 것 들기, 힘주기, 성관계를 피하세요.**
- 대변을 부드럽게 유지하고 활동을 서서히 늘려 가세요.

다음 증상이 있으면 의료진에게 연락하세요:

- 발열 또는 오한, 또는 심한 출혈
- 소변을 볼 수 없거나** 통증이 심해지는 경우
- 나중에: **성교통**, 이상한 분비물, 또는 파트너가 무언가를 느끼는 경우(메시 노출 가능성)

기억할 세 가지

- 이식편은 질식 탈출증 교정을 보강합니다 — 생물학적 이식편은 흡수되고, 합성 메시는 영구적이며 선별적으로 사용됩니다.
- 탈출증에 대한 질내 합성 메시는 FDA 경고를 받았습니다. 자가 조직 교정과 생물학적 이식편이 주로 사용되며, 복부 메시는 별도의 선택지입니다.
- 어떤 재료를 왜 사용하는지 정확히 물어보세요. 이후 성교통이나 이상한 분비물이 있으면 의료진에게 알려주세요.