

질 현수술은 질 상단(질원개) 또는 자궁의 탈출증을 교정하는 수술입니다. 본인의 강한 골반 인대에 다시 고정하며 자가 조직만 사용하고 메시는 사용하지 않습니다. 복부 절개 없이 질을 통해 시행하며, 지지력과 질 깊이를 회복하는 내구성 있는 메시 없는 방법입니다.

이 수술에 대하여

질 상단을 골반 내 단단한 인대에 봉합사로 고정하여 들어 올립니다. 대표적인 두 가지 방법은 다음과 같습니다:

- **자궁천골인대 현수술(USLS)** — 골반 깊숙이 위치한 자궁천골인대에 고정
- **천극인대 고정술(SSLF)** — 측면의 천극인대에 고정

두 방법 모두 **본인의 조직**(영구 봉합사)을 사용하며 메시가 없습니다. 전·후 벽 교정술과 함께 시행하는 경우가 많으며, 자궁 적출 시 동시에 진행할 수 있습니다.

다른 수술과의 비교

천골질고정술(sacrocolpopexy)은 복부 메시로 질을 들어 올리는 방법입니다. 질 현수술은 메시와 복부 절개를 피할 수 있으며, 천골질고정술이 내구성이 약간 더 높을 수 있습니다. 집도의와 함께 장단점을 충분히 상의하세요.

용어 설명

첨부 / 질원개

탈출 시 아래로 처질 수 있는 질의 상단 부위입니다.

현수술

질 상단을 강한 인대에 다시 고정하는 수술입니다.

USLS

자궁천골인대 현수술.

SSLF

천극인대 고정술.

자가 조직

본인의 조직 — 이 수술은 메시지를 사용하지 않습니다.

질원개 탈출증

주로 자궁 적출 후 질 상단이 내려앉은 첨부 탈출입니다.

아픈가요? 마취 하에 시행하므로 수술 중에는 통증이 없으며 복부 절개도 없습니다. 천극인대 고정술(SSLF)의 경우, 일부 환자는 회복 과정에서 며칠에서 몇 주 동안 **엉덩이 또는 허벅지 위쪽 불편감**을 느낄 수 있으나 대개 자연스럽게 사라집니다.

준비 방법

- **마취 지침**을 따르세요(금식, 지시에 따라 혈액희석제 복용 중단).
- 수술 전 평가를 받으며, 전벽·후벽 교정이나 요실금 방지 시술을 병행할 수 있습니다.
- 금연하고, 귀가 교통편과 가정 내 도움을 미리 준비하세요.

진행 과정

- 1 마취 후 항생제를 투여합니다.
- 2 질을 통해 질 상단을 단단한 골반 인대에 봉합합니다.
- 3 계획된 벽 교정술을 추가로 시행합니다.
- 4 도뇨관과 경우에 따라 질 거즈를 잠시 삽입합니다.

수술 후

- 당일 또는 1박 후 퇴원하며, 가벼운 분비물·출혈은 정상입니다.
- **약 6주간 무거운 것 들기, 힘주기, 성관계를 삼가세요.**
- SSLF 후 엉덩이 불편감은 수 주에 걸쳐 완화됩니다. 변을 부드럽게 유지하세요.

다음 증상이 있으면 의료진에게 연락하세요:

- 발열 또는 오한, 심한 출혈
- 소변을 볼 수 없거나 골반 통증이 악화되는 경우
- 심하거나 날카로운 엉덩이·다리 통증, 또는 새로 생긴 감각 이상

기억할 세 가지

1. 질 현수술은 본인의 인대를 이용해 질 상단을 들어 올립니다 — 내구성이 높고, 메시 없이 질을 통해 시행합니다.
2. 주요 방법은 USLS와 SSLF이며, 메시·복부 수술을 원한다면 천골질고정술과 비교해 보세요.
3. 약 6주간 무거운 것 들기와 성관계를 삼가세요. SSLF 후 엉덩이 통증이 생길 수 있으며, 발열·심한 출혈·다리 통증 시 바로 연락하세요.