

腎盂成形術

病人須知 · 修復腎臟排尿出口阻塞嘅手術

WARWIKI

腎盂成形術係一個修復腎臟排尿出口阻塞嘅手術。腎臟同輸尿管（負責將尿液輸送去膀胱嘅管道）之間嘅連接處可能太窄，令尿液積聚，引起痛楚、感染或腎臟受損。手術會切除阻塞部分，重建一個寬闊暢通嘅連接 — 係最耐用嘅修復方法，成功率超過九成。

關於呢個手術

喺輸尿管頂端，即係同腎臟嘅集尿囊（**腎盂**）相接嘅位置，可能出現狹窄，令尿液引流減慢。有時附近嘅**血管**會壓住呢個位置。呢個情況叫做**腎盂輸尿管連接部阻塞（UPJ 阻塞）**。做腎盂成形術時，你嘅外科醫生會：

- 切除狹窄嘅部分
- 將健康嘅輸尿管縫合到腎盂，形成一個**寬闊漏斗形嘅連接**
- 放入一條柔軟嘅內置**支架管**，喺癒合期間撐住個口

大部分情況係用**機械臂或腹腔鏡**透過幾個細小切口進行；有時會用開腹手術。

安唔安全？

腎盂成形術係一個成熟、高效嘅手術，長期成功率超過九成。同所有手術一樣，有少量風險 — 包括出血、感染，或暫時性尿液滲漏（通常由支架管同引流管處理）。狹窄復發並不常見，如有需要一般可以再處理。

詞彙解釋

腎臟

負責過濾血液、製造尿液嘅器官。

輸尿管

將尿液由腎臟輸送去膀胱嘅管道。

UPJ

腎盂輸尿管連接部 — 腎臟同輸尿管相接嘅位置，即係阻塞所在。

腎盂

尿液進入輸尿管前積聚嘅漏斗形囊袋。

輸尿管支架管

一條柔軟嘅內置管（「雙 J 管」），喺手術修復癒合期間撐開連接位置。

交叉血管

壓住連接部位並引致阻塞嘅血管。

腎積水

因尿液喺阻塞後面積聚而引起嘅腎臟腫脹。

機械臂／腹腔鏡

透過幾個細小切口進行嘅微創手術。

會唔會痛？ 手術係喺全身麻醉下進行，過程中你唔會感到任何痛楚。之後，小切口位置會有少少酸痛，微創手術所用嘅氣體有時會令肩膊或腹部感到不適。內置支架管可能引起尿急感，或者小便時側腰輕微刺痛。大部分人需要住院 1-2 晚；手術通常需要 2-3 小時。

點樣準備（手術之前）

- 手術係喺**全身麻醉**下進行 — 請遵從所有術前指示（包括禁食，以及需要暫停哪些藥物，包括薄血藥）。
- 需要驗**尿液**以確認有冇感染 — 如有感染須先行治療。
- 預計體內支架管需放置約**4-6 星期**，並安排人接送返屋企。

如果你有以下情況，請提早告知醫療團隊：

- 正在服用**薄血藥**，或者而家有尿道感染
- 曾經做過腎臟或腹部手術

手術點樣做

- 1 你喺麻醉下入睡，同時注射抗生素。
- 2 外科醫生做幾個細小切口（或一個開腹切口），暴露阻塞嘅連接部位。
- 3 切除狹窄部分，並重新塑造腎盂形狀。
- 4 將健康嘅輸尿管縫合到腎盂，形成寬闊漏斗形連接，內置支架管固定；可能放置引流管，然後縫合切口。

之後

- 通常**一至兩日**後可以出院。
- **支架管會留喺體內約 4-6 星期**，之後喺門診用膀胱鏡快速取出。
- 支架管引起嘅症狀 — 尿急、小便時側腰輕微刺痛或尿液帶少少粉紅色 — 係**正常**嘅。
- 數星期內**避免搬重物或用力**，並要多飲水。

如果你有以下情況，請即刻聯絡醫療團隊：

- 發燒或畏寒
- 嚴重或持續惡化嘅側腰或腹部痛
- 大量出血，或尿液有血塊
- 完全唔能夠排尿，或持續噁心嘔吐
- 切口位置越來越紅、痛或有分泌物

要記住嘅三件事

1. 腎盂成形術切除腎臟排尿出口嘅阻塞，重建寬闊嘅連接 — 係最耐用嘅修復方法，通常透過細小切口完成。
2. 準備工作：遵從禁食同藥物指示、先治療感染、安排支架管放置約 4-6 星期，並安排人接送。
3. 支架管取出前會引起尿急或側腰輕微刺痛，呢啲係正常嘅。如有發燒、劇痛、大量出血或完全唔能夠排尿，請即刻求醫。