

逆行尿道造影 (RUG)

病人須知 · 做尿道 X 光檢查前嘅準備

WARWIKI

逆行尿道造影 — 即係“RUG” — 係一個短暫嘅 X 光檢查，用嚟影你尿道嘅圖像。尿道係負責將尿液排出身體嘅管道。醫生會將少量顯影劑輕輕注入尿道，令尿道喺 X 光下清晰顯現。呢個檢查幫助外科醫生喺制定治療方案之前，找到並量度任何尿道狹窄、疤痕或損傷。

關於呢個檢查

尿道內嘅疤痕或狹窄 — 稱為**尿道狹窄 (stricture)** — 喺一般掃描上難以睇到。RUG 將特殊顯影劑注入尿道，令尿道喺 X 光下呈白色，形成清晰嘅「地圖」。

你嘅醫生可能會安排 RUG 嚟：

- 找出並準確量度尿道狹窄或疤痕嘅位置同長度
- 喺損傷後檢查尿道狀況
- 為尿道修復手術制定計劃
- 術後跟進尿道癒合情況

呢個檢查顯示尿道內嘅通道 — 即係尿液流過嘅路徑。佢唔係用嚟睇腎臟，亦唔係治療；係一幅指引下一步行動嘅圖像。

安唔安全？

安全嘅。RUG 係一個常見、低風險嘅檢查。X 光劑量細，顯影劑係水溶性，會隨尿液排出體外。大部分人只有短暫輕微嘅不適。少見副作用 — 如尿道感染 (UTI)、少量出血或短暫小便困難 — 通常都輕微，會快快好返。

詞彙解釋

尿道

將尿液由膀胱帶出體外嘅管道。

尿道狹窄 (Stricture)

尿道內嘅狹窄或疤痕位置，會減慢或阻礙尿液流動。

顯影劑

喺 X 光下呈白色嘅液體，令尿道內部可以清晰睇到。

尿管 (Catheter)

幼細嘅軟管。呢個檢查只係將管嘴放喺尿道口位置 — 唔會全條插入。

透視造影

一種可以即時顯示顯影劑流動嘅動態 X 光技術。

尿道口 (Meatus)

陰莖頂端排出尿液嘅開口。

尿液培養

喺檢查前對尿液樣本進行嘅快速測試，用嚟確認有冇感染。

重建泌尿科醫生

專門修復尿道及泌尿系統嘅外科醫生。

會唔會痛？ 大部分人只係感到顯影劑注入時短暫嘅壓力或輕微刺痛，唔係劇痛。醫療團隊可以隨時放慢速度 — 如果你唔舒服，話俾佢哋知就得。整個檢查約需 15–30 分鐘。

點樣準備（檢查之前）

準備工夫好少。大多數情況下：

- 可以**正常飲食** — 除非醫療團隊另有指示，唔需要禁食。
- 照常服用**日常藥物**，除非醫療團隊叫你停某種藥。
- 大多數病人唔需要鎮靜，通常可以自己駕車回家。

請提早告知醫療團隊，如果你：

- 曾經對 X 光顯影劑或碘有過敏反應
- 有服用薄血藥
- 有尿道感染症狀（灼熱感、發燒，或尿液混濁、氣味強烈） — 如有活躍感染，檢查可能需要改期

你可能需要提供**尿液樣本**檢查有冇感染，並可能喺檢查前後服用**抗生素**以降低感染風險。

檢查過程中會發生咩事

- 1 你會躺喺 X 光檯上，通常側身少少。醫療團隊會協助你調整姿勢。
- 2 陰莖頂端會被清潔。一條幼細嘅軟管會放喺**尿道口位置** — 只係管嘴。可能會輕輕充氣一個細小氣球將管固定。
- 3 顯影劑會緩緩注入尿道，同時拍攝 X 光圖像。你可能需要保持靜止，正常呼吸。
- 4 醫療團隊會喺屏幕上觀察顯影劑流動，並從不同角度拍攝幾張圖像。之後取出軟管。

之後

- 通常可以即時回家，**恢復正常活動**。
- 小便時可能有**輕微灼熱感**，持續一天左右。多飲水有助沖走顯影劑，減輕不適。
- 尿道口或尿液可能有**少量血絲或粉紅色**，呢個係常見情況，通常一天內消退。
- 顯影劑會喺之後數小時內隨尿液排出體外。

如果你有以下情況，請即刻聯絡醫療團隊：

- 發燒或畏寒
- 小便困難，或完全排唔到尿
- 大量出血，或血流唔止
- 痛楚越嚟越嚴重

要記住嘅三件事

1. RUG 係一個快速、安全嘅 X 光檢查，用顯影劑繪製你尿道內部嘅地圖 — 幫助外科醫生制定正確嘅治療方案。
2. 準備工夫好少。正常飲食同服藥 — 但要告知醫療團隊有冇顯影劑過敏、薄血藥或尿道感染症狀。
3. 大部分人只感到短暫壓力，可以即時回家。輕微灼熱感或少量血絲係正常嘅 — 多飲水，若有發燒、大量出血或小便困難請即求診。