

麻醉下輸尿管評估

病人須知 · 修復手術前確認輸尿管狹窄位置

WARWIKI

呢個係喺麻醉狀態下對輸尿管進行嘅詳細檢查 — 輸尿管係由腎臟將尿送到膀胱嘅管道。外科醫生會用幾種方法結合，精確確定狹窄嘅位置同長度，以便計劃合適嘅修復方案。

關於呢個檢查

輸尿管狹窄 (**stricture**) 難以從外部量度，所以外科醫生喺你睡著嘅時候直接檢查。視乎需要，檢查可能用以下**任何組合**：

- **診斷性輸尿管鏡** — 將纖細嘅柔性攝像鏡伸入輸尿管內部查看。
- **逆行腎盂造影** — 從膀胱向上注射顯影劑，配合X光顯示管道輪廓。
- **順行腎盂造影** — 如果你有腎臟引流管，顯影劑從上方向下流過狹窄位置。
- **膀胱鏡／膀胱造影** — 查看膀胱內部並拍X光相。

目標係得到精確嘅路線圖 — 狹窄嘅位置、長度同程度。同一次手術中可能會放入或更換**輸尿管支架**或腎臟引流管。

安唔安全？

安全。呢係一個常見、低風險嘅檢查。大多數人之後只有短暫小便有血、輕微灼熱感或腰部隱痛。較少見嘅問題包括尿道感染或輸尿管短暫刺激；輕微輸尿管損傷係罕見。麻醉整體上係非常安全嘅。

詞彙解釋

輸尿管

由腎臟將尿液輸送到膀胱嘅管道。

Stricture (狹窄)

因疤痕組織形成嘅收窄位置，令尿液流動減慢或阻塞。

輸尿管鏡

用纖細柔性攝像鏡查看輸尿管內部。

逆行腎盂造影

從膀胱向上注射顯影劑後拍攝嘅輸尿管及腎臟X光。

順行腎盂造影

顯影劑從腎臟引流管向下注射後拍攝嘅X光。

腎造瘻管

從背部引流腎臟嘅管道；可以通過佢注射顯影劑。

顯影劑

喺X光下顯示為白色嘅液體，用於顯示管道。

支架

保持輸尿管暢通嘅軟性內管；可能會放入或更換。

會唔會痛？ 你喺麻醉狀態下睡著，檢查過程中完全唔會有感覺。之後可能有輕微灼熱感、腰部隱痛或尿液帶血，持續一至兩日。呢係短暫嘅程序，通常當日可以回家。

點樣準備（檢查之前）

- 呢個係喺**麻醉**下進行 — 跟從所有手術指示（禁食時間，以及要暫停哪些藥物，包括薄血藥）。
- **尿液檢查**確認有冇感染 — 如有活躍感染須先治療。
- 保留現有**腎臟引流管或支架**，並**安排人接送回家**。

請**提前告知醫療團隊**，如果你：

- 曾經對**X光顯影劑或碘**有過敏反應
- 正在服用**薄血藥**，或有尿道感染跡象

檢查過程中會發生咩事

- 1 你喺麻醉下睡著，並會注射抗生素。
- 2 膀胱鏡伸入膀胱，顯影劑向上注入輸尿管同時拍X光，及/或攝像鏡伸入輸尿管查看。
- 3 如果你有腎臟引流管，顯影劑可從上方向下流，從兩個方向顯示狹窄位置。
- 4 記錄檢查結果，如有需要放入或更換支架或腎臟引流管。

之後

- 你從麻醉中清醒後，通常**當日可以回家**，需要有人接送。
- 一至兩日內可能有**輕微灼熱感、腰部隱痛或尿液帶粉紅色**。多喝水有幫助。
- 如果放咗支架，排尿時有尿急感或輕微不適係正常。
- 外科醫生會分析結果，同你討論下一步修復計劃。

如果你有以下情況，請即刻聯絡醫療團隊：

- 發燒或發冷
- 嚴重或加劇嘅腰部或腹部疼痛
- 大量出血或尿液中有血塊
- 無法排尿，或持續噁心嘔吐

要記住嘅三件事

1. 呢個檢查喺你睡著時，用攝像鏡和顯影劑從下方及/或上方檢查輸尿管狹窄，讓外科醫生計劃修復方案。
2. 因為需要麻醉，請跟從禁食和藥物指示，先治療感染，保留腎臟引流管或支架，並安排人接送。
3. 大多數人當日可以回家。一至兩日內輕微灼熱、腰部隱痛或尿液稍帶粉紅係正常 — 多喝水，如有發燒、劇痛或大量出血請立即求診。