

尿道成形術（尿道修復手術）

病人須知 · 修復尿道狹窄嘅手術

WARWIKI

尿道成形術係用嚟修復尿道（將尿液排出體外嘅管道）狹窄或疤痕部分嘅手術。尿道狹窄 (stricture) 會令尿流減慢甚至受阻；尿道成形術可以將佢重新打開，係最耐用、效果最持久嘅修復方法。呢份須知會解釋手術點樣做、點樣準備，以及術後會點樣。

關於呢個手術

尿道狹窄 (stricture) 係尿道裡面一個疤痕收窄嘅位置，令你難以排清膀胱入面嘅尿。同單純擴張或切開狹窄（容易復發）唔同，尿道成形術會重建尿道至正常寬度 — 係最可靠、最持久嘅治療方法，成功率約 85–95%。手術方式取決於狹窄嘅位置同長度：

- 切口可能喺陰莖上、喺陰囊同肛門之間嘅部位（會陰部），或者兩者都有一視乎狹窄嘅位置而定。
- 短嘅狹窄可以切除後將健康兩端縫合埋一齊。
- 長嘅狹窄就要用移植組織 (graft) 嚟擴闊 — 通常係取自你口腔內側嘅組織（呢部分有獨立須知）。

你嘅外科醫生會話畀你聽邊種方式最適合你嘅狹窄情況。

安唔安全？

尿道成形術係一個成熟、高效嘅手術；大多數男士術後都可以擁有持久暢通嘅尿道。同所有手術一樣，有少量風險 — 包括出血、感染，或狹窄隨時間復發（通常可以再次治療）。對勃起或射精造成影響嘅情況不常見，而且通常係暫時性嘅。

詞彙解釋

尿道

將尿液由膀胱排出體外嘅管道。

尿道狹窄 (Stricture)

尿道入面一個疤痕收窄嘅位置，令尿流減慢或受阻。

尿道成形術

修復狹窄、將尿道重建至正常寬度嘅手術。

移植組織 (Graft)

取自你自己身體（通常係口腔內側）嘅一小塊組織，用嚟擴闊尿道。

會陰部

陰囊同肛門之間嘅部位，係其中一個常見切口位置。

尿管 (Catheter)

術後留嚟尿道約 1–4 星期嘅軟管，讓修復處癒合。

尿道造影

用 X 光檢查尿道，確認修復癒合後先拔走尿管。

全身麻醉

令你喺手術期間完全睡著、無痛感嘅藥物。

會唔會痛？ 手術係全身麻醉或脊椎麻醉下進行，過程中你唔會有任何感覺。術後切口位置（陰莖及/或會陰部）會有痠痛、腫脹同瘀青，持續數星期 — 冰敷、陰囊托帶同止痛藥都有幫助。醒來時你會裝住尿管。手術時間視乎修復方式，通常需要 2–4 小時。

點樣準備（術前）

- 手術係全身麻醉或脊椎麻醉下進行 — 請跟從所有手術指示（禁食，以及需要暫停邊啲藥物，包括薄血藥）。
- 需要做尿液檢查排除感染 — 如有感染須先行治療。
- **唔好吸煙** — 會拖慢癒合。如果可能需要取口腔黏膜，要保持口腔清潔，或者需要洗牙。
- 預備好術後帶住尿管（約 1–4 星期），並安排有人接你回家。

請提前告知你嘅醫療團隊，如果你：

- 正在服用薄血藥，或者有現時嘅尿道或皮膚感染
- 曾經做過尿道手術、放射治療，或者有硬化性苔蘚等皮膚病

手術過程

- 1 你會係麻醉下完全睡著或腰部以下失去知覺；同時會給予抗生素。
- 2 外科醫生係狹窄位置（陰莖、會陰部或兩者）切開，並打開疤痕段。
- 3 修復狹窄 — 切除後將兩端縫合，或者用移植組織擴闊。
- 4 放入尿管引流尿液並保護修復處讓其癒合；然後縫合切口。

術後

- 你會帶住尿管回家，通常需要約 1–4 星期。醫療團隊會教你點樣護理 — 唔好拉扯佢。
- 早期尿管周圍出現腫脹、瘀青同少量血色尿液係正常嘅。
- 數星期內（通常約 6 星期）**避免負重、用力、踩單車同性行為**，讓修復處好好癒合。
- 拔走尿管前，通常需要做尿道 X 光造影確認修復已癒合。

如果你有以下情況，請即刻聯絡醫療團隊：

- 尿管甩咗出嚟、阻塞或停止引流
- 發燒或畏寒，或切口位置出現越來越多嘅紅腫、疼痛或分泌物
- 大量出血，或拔走尿管後無法排尿

要記住嘅三件事

1. 尿道成形術重建狹窄嘅尿道，係最持久嘅修復方法。切口可能係陰莖、會陰部或兩者，並可能用到移植組織（通常來自口腔）— 你嘅外科醫生會解釋你嘅手術方案。
2. 準備工作：跟從禁食同藥物指示，先治療任何感染，唔好吸煙，並預備好術後帶住尿管（約 1–4 星期）。
3. 等醫療團隊（通常係做完癒合 X 光後）先拔走尿管；數星期內避免負重、用力同性行為。如果尿管停止引流、發燒，或拔管後無法排尿，即刻聯絡醫生。