

尿動力學檢查

WARWIKI

病人須知 · 測試你膀胱儲尿同排尿功能嘅檢查

尿動力學檢查 (Urodynamics) 係一組測試，用嚟評估你膀胱儲尿同排尿嘅功能。檢查時會用幼軟嘅尿管量度壓力，同時慢慢將膀胱填滿再排出。目的係喺診所內重現你嘅症狀，幫助醫療團隊找出確實原因，制定合適嘅治療方案。

關於呢個檢查

Urodynamics 唔係單一測試，而係幾個項目一齊進行。視乎你嘅情況，可能包括：

- **尿流測試** — 你喺特製坐廁排尿，儀器量度尿流速度，同時檢查剩餘尿量。
- **充盈期測試** — 慢慢將膀胱填滿，同時量度壓力，你要報告自己嘅感覺。
- **排尿壓力測試** — 你排尿時量度壓力。
- 有時會同步拍攝 **X 光影像**（即影像尿動力學）。

檢查用兩條幼管：一條經尿道放入膀胱，另一條細小嘅放入直腸（或陰道），量度腹腔壓力，讓醫生分辨膀胱壓力同使力嘅分別。

安唔安全？

安全。Urodynamics 係低風險嘅互動式測試。主要風險來自尿管——短暫嘅灼熱感，以及輕微感染風險。醫生可能會處方抗生素預防。無需手術，亦唔需要恢復期。

詞彙解釋

尿動力學檢查

測量膀胱儲尿同排尿功能嘅一組測試。

膀胱

儲存尿液直至排尿嘅肌肉囊。

尿管

用嚟充盈膀胱及量度壓力嘅幼軟管。

充盈期測試

膀胱慢慢充盈時量度壓力及感覺。

排尿壓力測試

排尿時量度壓力，評估膀胱排空情況。

尿流測試

量度尿流速度及形態。

影像尿動力學

同步加入 X 光影像嘅 Urodynamics 檢查。

排尿後殘餘尿量

排尿後膀胱內剩餘嘅尿液量。

會唔會痛？ 大多數人感覺到嘅係壓力感同輕微不適，而唔係真正嘅痛。檢查期間你需要咳嗽、改變姿勢同排尿——醫療團隊會保護你嘅私隱，按你嘅節奏進行。整個過程約需 30–60 分鐘，之後可以即時回家。

點樣準備（檢查前）

- 可能需要你 **帶住適度充盈嘅膀胱** 到達——請跟隨所給嘅指示。
- 繼續服用 **平時嘅藥物**，但要問清楚係咪需要 **暫停任何膀胱藥物**，因為呢啲藥可能影響結果。
- 無需鎮靜，通常可以 **自己開車回家**。

如果你有以下情況，請 **提前** 告知醫療團隊：

- 有 **尿道感染** 徵狀（灼熱、發燒、尿液混濁或有異味）— 如有活躍感染，可能需要改期
- 正在服用薄血藥，或對任何東西過敏（包括乳膠）

檢查前可能需要你提供 **尿液樣本** 以排除感染。

過程中會發生咩事

- 1 你先喺特製坐廁排尿，儀器量度尿流，醫生同時檢查剩餘尿量。
- 2 輕輕放入幼管——一條入膀胱，一條細小嘅入直腸或陰道。
- 3 慢慢充盈膀胱，你要報告初次感覺有尿同強烈尿意嘅時間；期間可能需要咳嗽或改變姿勢。
- 4 你排尿時同步記錄壓力，之後移除尿管。

之後

- 可以 **即時恢復正常活動**。
- 排尿時可能有 **輕微灼熱感**，持續一兩日。多飲水有助舒緩。
- 尿液可能有少量 **粉紅色**，屬正常現象，通常一日內消退。

如果你有以下情況，請即刻聯絡醫療團隊：

- 發燒或畏冷
- 排尿困難或完全排唔到尿
- 大量出血或尿液有血塊
- 痛楚愈來愈嚴重

要記住嘅三件事

1. Urodynamics 量度你膀胱儲尿同排尿嘅情況，幫助醫療團隊找出漏尿、尿急或排尿困難嘅原因，從而制定合適治療。
2. 準備工夫唔多：問清楚係咪要暫停膀胱藥物；如有指示，帶住適度充盈嘅膀胱到達；若有感染徵狀請提前告知。
3. 預期有壓力感多過痛感，檢查後可即時回家。輕微灼熱或尿液略帶粉紅屬正常——多飲水；如有發燒、大量出血或排尿困難請聯絡醫生。