

يُعالج العلاج بالتستوستيرون البديل (TRT) الرجال الذين يعانون في الوقت ذاته من انخفاض مؤثّق في مستوى التستوستيرون ومن أعراضه — كضعف الرغبة الجنسية، والتعب، وتدني المزاج، أو ضعف العضلات والانتصاب. يُعيد العلاج التستوستيرون إلى النطاق الطبيعي باستخدام هلام أو حقن أو لصقة أو حبيبات مزروعة. هو ليس علاجاً "لمكافحة الشيخوخة" ولا يُوصف لمن يملك مستويات طبيعية.

كيف يعمل & من يحتاجه

يُشخّص نقص التستوستيرون (قصور الغدد التناسلية) بفحصي دم صباحيين إضافةً إلى الأعراض — رقم منخفض واحد وحده غير كافٍ. حين يجتمع الأمران، يُحسّن التعويض الطاقة والرغبة الجنسية والمزاج والعضلات على مدى أسابيع إلى أشهر.

أشكال العلاج

- الهلام أو المحلول — يُطبّق يومياً (يجب تجنّب انتقاله عبر الجلد إلى النساء والأطفال).
- الحقن — كل 1-2 أسابيع، أو شكل مديد المفعول كل 10~ أسابيع.
- اللصقات، الحبيبات المزروعة (كل 3-6 أشهر)، أو هلام أنفي.

تعلم المصطلحات

التستوستيرون

الهرمون الذكري الرئيسي؛ يؤثر في الرغبة الجنسية والطاقة والمزاج والعضلات.

قصور الغدد التناسلية

انخفاض مؤثّق في التستوستيرون.

الهيماوكريت

قياس خلايا الدم الحمراء الذي قد يرتفع مع TRT — يُراقب دورياً.

PSA

فحص دم للبروستاتا يُجرى قبل العلاج وأثناءه.

الخصوبة

يُقلّل TRT إنتاج الحيوانات المنوية — مهم إذا كنت ترغب في الإنجاب.

انتقال الهلام

انتقال الهلام للآخرين بملامسة الجلد — غطّ المنطقة واغسل يديك.

هل تخطط للإنجاب؟ أخبر فريقك الطبي أولاً. يُقلّل TRT إنتاج الحيوانات المنوية وقد يسبّب العقم — أحياناً بصورة دائمة. إذا كانت الخصوبة مهمة لك، توجد علاجات أخرى ترفع التستوستيرون مع الحفاظ على الحيوانات المنوية. لا تبدأ TRT دون مناقشة هذا الأمر.

المتابعة الدورية (مهمة)

يستلزم TRT فحوصات منتظمة وتحاليل دم:

- مستوى التستوستيرون — للتأكد من بقائه ضمن النطاق الطبيعي.
- الهيماتوكريت — قد يزيد TRT لزوجة الدم؛ يُعدّل الجرعة أو يُوقف عند الارتفاع الزائد.
- PSA / البروستاتا — يُفحص قبل العلاج وأثناءه؛ لا يبدأ TRT مع سرطان بروتستاتا غير مُعالج.

الاستخدام الآمن

- الهلام: طُبِّقه حسب التعليمات، اتركه يجفّ، غطّ المنطقة، واغسل يديك — تجنّب انتقاله للنساء والأطفال.
- لا تُعدّل الجرعة بنفسك؛ احرص على حضور جميع مواعيد التحاليل.
- أخبر فريقك بأي أمراض قلبية أو انقطاع التنفس أثناء النوم (قد يزيد TRT من حدّته).

آثار جانبية شائعة

- حبّ الشباب، دهنية الجلد، احتباس السوائل
- حساسية الثدي؛ تصعّر الخصيتين؛ انخفاض الخصوبة
- ارتفاع خلايا الدم الحمراء (قد يستلزم مراقبة أو سحب دم)

اتصل بفريقك الطبي أو اطلب الرعاية إذا كان لديك:

- ألم الصدر، أو تورّم/ألم الساق، أو صعوبة التنفس
- صداع شديد، أو تغييرات في الرؤية، أو أعراض "تغلّظ الدم"
- مشكلات بولية جديدة أو مخاوف تتعلق بالبروستاتا

ثلاثة أمور تُذكرها

1. TRT مخصّص للرجال الذين لديهم انخفاض مؤقت في التستوستيرون مع أعراض — ليس للمستويات الطبيعية أو لمكافحة الشيخوخة.
2. يُقلّل الخصوبة — أخبر فريقك قبل البدء إذا كنت تفكّر في الإنجاب.
3. يستلزم متابعة مستمرة (التستوستيرون، تعداد الدم، البروستاتا). مع الهلام، تجنّب انتقاله للآخرين.