

TURP هي جراحة شائعة وفعالة لتضخم البروستاتا الحميد (BPH) الذي يعيق تدفق البول. يُدخل الجراح منظاراً عبر الإحليل — دون شق خارجي — ويزيل الأنسجة الداخلية المضغوطة على مجرى البول. تمنح العملية تحسناً قوياً ودائماً في التدفق، وتمتلك سجلاً ممتداً على مدى عقود.

عن هذا الإجراء

يُدخل جهاز رفيع يُسمى المنظار الاستئصالي (resectoscope) عبر الإحليل. يستخدم الجراح حلقة كهربائية صغيرة لإزالة الأنسجة الداخلية المعيقة قطعةً قطعة، مما يوسع مجرى البول. تبقى الأجزاء الخارجية للبروستاتا في مكانها. تُوضع قسطرة بعد العملية لفترة قصيرة أثناء التعافي.

هل هو آمن؟

TURP من أكثر العمليات البولية دراسةً وفعاليةً. كأى جراحة، تنطوي على مخاطر — نزيف وعدوى وتهيج مؤقت — وبعض التغييرات المتوقعة (أدناه). تُعطي أفضل نتائجها في البروستات متوسطة الحجم؛ أما الغدد الكبيرة جداً فقد تستدعي HoLEP أو Aquablation أو استئصال البروستاتا البسيط.

تعلم المصطلحات

TURP

استئصال البروستاتا عبر الإحليل — جراحة منظرية لـ BPH.

BPH

تضخم البروستاتا الحميد (غير السرطاني).

Resectoscope

المنظار المزود بحلقة لاستئصال أنسجة البروستاتا.

القذف الرجعي

عودة السائل المنوي إلى المثانة — تأثير شائع وغير ضار.

القسطرة

أنبوب لتصريف المثانة لمدة 1-3 أيام بعد العملية.

ري المثانة

شطف لطيف عبر القسطرة لإزالة الدم في المرحلة الأولى.

ما الذي يتغير بعد العملية؟ يحصل معظم الرجال على تدفق بول أقوى بكثير. التغيير الدائم الأكثر شيوعاً هو **القذف الرجعي** — يترد السائل المنوي إلى المثانة، فيكون الشعور بالنشوة طبيعياً مع إفراز ضئيل أو معدوم. هذا غير ضار (وإن كان يؤثر في الخصوبة). التأثيرات الخطيرة على الانتصاب أو التحكم في البول نادرة.

كيف تستعدّ

- تُجرى تحت تخدير نخاعي أو عام — اتّبع تعليمات الصيام والأدوية (أوقف مميّعات الدم كما يُوجّه).
- فحص البول مسبقاً للتأكد من غياب العدوى.
- رتّب وسيلة مواصلات؛ وخطّط لوجود قسرة لأيام قليلة.

ما الذي يحدث بعد العملية

1 أنت تحت التخدير؛ تُعطى المضادات الحيوية.

2 تُزال أنسجة البروستاتا المعيقة عبر المنظار.

3 تُوضع قسرة، وأحياناً يُجرى شطف لطيف للمثانة في اليوم الأول.

4 عادةً ليلة واحدة في المستشفى؛ تُنزع القسرة في 1-3 أيام.

توقّع بولاً ممزوجاً بالدم مع بعض الحرقنة والإلحاح لأسبوعين؛ اشرب السوائل وتجنّب الجهد والرفع الثقيل.

اتصل بفريقك الطبي إذا كان لديك:

- عدم القدرة على التبول بعد نزع القسرة
- نزيف غزير أو جلطات تعيق التدفق
- حمّى أو قشعريرة
- نزيف يزداد سوءاً (نزيف خفيف حوالي الأسبوع 1-2 أمر شائع — الراحة والسوائل كافية)

ثلاثة أمور تذكرها

1. TURP يزيل الأنسجة الداخلية المعيقة عبر منظار بلا شق — المعيار الراسخ والفعال لـ BPH متوسط الحجم.
2. توقّع تدفقاً أقوى؛ التغيير الدائم الشائع هو القذف الرجعي الجاف (غير ضار).
3. البول الممزوج بالدم والتهيج يتلاشيان خلال أسبوعين. اتصل عند عدم التبول أو نزيف غزير أو حمّى.