

حقن تضخيم الإحليل علاج طفيف التوغل لسلس البول الإجهادي — التسرب عند السعال أو الضحك أو النشاط البدني. تُحقن مادة ناعمة حول الإحليل (مجرى البول) لمساعدته على الانغلاق الجيد فيقل تسرب البول عند ارتفاع الضغط. الإجراء سريع ولا يستلزم شقاً، وهو بديل أو خطوة تمهيدية قبل جراحة الحبال.

كيف تعمل

تُحقن المادة في جدار الإحليل عند نقاط محددة لتضخيمه حتى يُغلق القناة بصورة أكمل. وبذلك تصبح الزيادات المفاجئة في ضغط البطن أقل قدرة على دفع البول للخارج.

هل هذا الخيار مناسب لي؟

- خيار جيد إذا كنت تريد علاجاً سريعاً ومنخفض الخطورة دون جراحة
 - مفيد لمن لا يستطيع إجراء جراحة الحبال أو يفضل تجنبها
 - يمكن أن يكون جسراً ريثما تتخذ قرارك بشأن الجراحة
- هو عموماً أقل ديمومة من الحبال وقد لا يعالج التسرب كلياً، لكن يمكن تكراره إذا تلاشى مفعوله.

تعلم المصطلحات

سلس البول الإجهادي

تسرب البول عند الضغط: السعال أو الضحك أو الرفع أو التمرين.

مادة التضخيم

المادة الناعمة المحقونة لتضخيم جدار الإحليل.

الإحليل

الأنبوب الذي يحمل البول إلى خارج الجسم.

المنظار (Cystoscope)

الكاميرا الرفيعة المستخدمة لتوجيه الحقنة.

الحبال (Sling)

دعامة جراحية تحت الإحليل — بديل أكثر ديمومة.

هل سيؤلم؟ عادةً ما يُجرى في العيادة مع تخدير موضعي ويستغرق نحو 10-15 دقيقة. يشعر معظم الناس بضغط خفيف فحسب ويعودون إلى المنزل في نفس اليوم، ويستأنفون نشاطهم العادي بسرعة. قد يحدث حرق خفيف مؤقت بعد الإجراء.

كيف تستعدّ

- فحص البول للتأكد من خلوّه من العدوى قبل الإجراء
- أخبر فريقك الطبي عن مميّعات الدم وأي حساسية لديك
- لا تحضّر كبير مطلوب — يمكنك عادةً قيادة السيارة للمنزل بنفسك

ما الذي يحدث

- 1 يُطبّق دواء تخدير موضعي.
- 2 يُدخّل منظار رفيع (Cystoscope) لرؤية الإحليل.
- 3 تُحقن مادة التضخيم عند نقاط متعددة حول الإحليل.
- 4 يُسحب المنظار، ثم تُفرّغ المثانة قبل المغادرة.

بعد

- حرق خفيف أو إلحاح للتبول أو كمية صغيرة من الدم في البول ليوم أو يومين أمر طبيعي.
- قد تواجه صعوبة مؤقتة في إفراغ المثانة مباشرة بعد الإجراء وعادة ما تزول سريعًا.

اتصل بفريقك الطبي إذا كان لديك:

- عدم القدرة على التبول بعد الإجراء
- حمّى أو قشعريرة (احتمال عدوى)
- نزيف غزير أو تفاقم الألم

معلومات مفيدة

- يظهر المفعول الكامل خلال أسابيع قليلة.
- إذا عاد التسرب مع الوقت، يمكن تكرار الحقنة.
- يظل الحبال (Sling) خيارًا متاحًا لاحقًا إذا أردت حلًا أكثر ديمومة.

ثلاثة أمور تنكّر لها

1. حقن تضخيم الإحليل إجراء سريع بلا شق يساعد الإحليل على الانغلاق ويقلل سلس البول الإجهادي.
2. هو أقل ديمومة من الحبال وقد لا يعالج التسرب كليًا، لكنه منخفض الخطورة وقابل للتكرار.
3. التعافي سريع. اتصل بفريقك إذا لم تستطع التبول أو ظهرت عليك حمّى بعد الإجراء.