

रुक-रुक कर स्व-कैथेटराइजेशन (ISC)

रोगी जानकारी • एक पतले catheter से खुद मूत्राशय खाली करना

WARWIKI

रुक-रुक कर स्व-कैथेटराइजेशन (ISC) एक तरीका है जिसमें आप खुद एक पतला, मुलायम catheter डालकर मूत्राशय (bladder) खाली करते हैं, पेशाब निकालते हैं, और catheter बाहर निकाल लेते हैं — यह दिन में कुछ बार किया जाता है। इसका उपयोग तब होता है जब bladder खुद ठीक से खाली नहीं होता। एक बार सीख लेने पर इसमें कुछ ही मिनट लगते हैं, आपको स्वतंत्रता मिलती है, और गुर्दे सुरक्षित रहते हैं।

क्यों किया जाता है

जब bladder पूरी तरह खाली नहीं हो पाता — कुछ सर्जरी के बाद, **न्यूरोजेनिक bladder** में, प्रोलैप्स में, या रुकावट के कारण — तो बचा हुआ पेशाब संक्रमण (UTI), रिसाव और गुर्दों पर दबाव पैदा कर सकता है। ISC एक नियमित समय पर bladder को **पूरी तरह खाली** करता है, जिससे ये समस्याएँ दूर होती हैं।

स्थायी catheter से बेहतर क्यों है

- हमेशा लगे रहने वाले catheter की तुलना में **कम संक्रमण**
- **कोई बैग नहीं** और अधिक स्वतंत्रता — catheterization के बीच कुछ भी जुड़ा नहीं
- bladder और गुर्दों की दीर्घकालिक सुरक्षा

पहले यह कठिन लग सकता है, लेकिन अधिकांश लोग — और देखभाल करने वाले — नर्स की मदद से जल्दी सीख जाते हैं।

शब्दों को समझें

ISC

रुक-रुक कर स्व-कैथेटराइजेशन — खुद bladder खाली करना, फिर catheter निकालना।

Catheter

पेशाब निकालने के लिए bladder में डाली जाने वाली पतली, मुलायम नली।

Post-void residual

पेशाब के बाद bladder में बचा हुआ पेशाब।

न्यूरोजेनिक bladder

तंत्रिका समस्या के कारण सामान्य रूप से काम न करने वाला bladder।

Clean technique

हाथ और क्षेत्र को धोना — साफ, पूरी तरह बाँझ नहीं।

Indwelling catheter

हमेशा लगा रहने वाला catheter जिसमें बैग होता है (ISC इससे बचाता है)।

क्या इसमें दर्द होगा? आमतौर पर नहीं — अधिकांश लोगों को केवल हल्का दबाव महसूस होता है; आधुनिक catheters पहले से lubricant लगे और बहुत पतले होते हैं। पहली कुछ बार हल्की असुविधा या थोड़ा खून आ सकता है। नर्स आपको कदम-दर-कदम तब तक सिखाती है जब तक आप खुद आत्मविश्वास से न करने लगें।

कैसे करें (Clean Technique)

- 1 हाथ धोएँ और सामान इकट्ठा करें; छेद को साफ करें।
- 2 धीरे से डालें lubricant लगा catheter जब तक पेशाब न आने लगे; थोड़ा और आगे बढ़ाएँ।
- 3 bladder को पूरी तरह खाली होने दें, फिर catheter धीरे-धीरे बाहर निकालें।
- 4 single-use catheters फेंक दें (या reusable को निर्देशानुसार साफ करें) और हाथ धोएँ।

कितनी बार

- आमतौर पर हर 4–6 घंटे (दिन में 4–6 बार) — आपकी टीम समय तय करती है।
- न छोड़ें — नियमित समय पर करने से overfilling और संक्रमण दूर रहते हैं।
- सामान्य रूप से पानी पिएँ; यदि कहा जाए तो output नोट करें।

ज़रूरी बातें

- किसी भी साफ बाथरूम में किया जा सकता है; सामान छोटा और आसानी से ले जाने योग्य है।
- थोड़ी धुंधलाहट या बैक्टीरिया सामान्य है — UTI का इलाज केवल लक्षण होने पर होता है।
- यदि आप खुद नहीं कर सकते तो देखभाल करने वाले को सिखाया जा सकता है।

यदि आपको ये हों तो अपनी चिकित्सा टीम को बुलाएँ:

- आप catheter नहीं डाल पा रहे, या भरा हुआ महसूस होने पर पेशाब कम/बिल्कुल नहीं आता
- बुखार, ठंड लगना, या पीठ/बगल में दर्द (संभावित संक्रमण)
- लगातार रक्तस्राव या तेज़ दर्द

याद रखने योग्य तीन बातें

1. ISC उस bladder को खाली करता है जो खुद नहीं खाली होता — गुर्दे सुरक्षित रहते हैं और संक्रमण व रिसाव से बचाव होता है।
2. नियमित समय पर (अक्सर हर 4–6 घंटे) clean technique से करें; नर्स तब तक सिखाएगी जब तक यह आसान न हो जाए।
3. आमतौर पर दर्दरहित है और हमेशा लगे catheter से सुरक्षित है। अगर डाल न पाएँ, खाली न हो, या बुखार हो तो तुरंत बुलाएँ।