

इंट्राकेवर्नोसल इंजेक्शन (ED के लिए लिंग इंजेक्शन)

रोगी जानकारी · स्तंभन दोष (ED) के लिए स्व-इंजेक्शन उपचार

WARWIKI

इंट्राकेवर्नोसल इंजेक्शन (ICI) स्तंभन दोष (ED) का एक उपचार है जिसमें एक छोटी सुई से लिंग के किनारे में थोड़ी दवा दी जाती है। यह तब उपयोगी है जब ED की गोलियाँ काम न करें। सुई बहुत छोटी होती है और अधिकांश पुरुषों को बहुत कम महसूस होता है — यह सबसे विश्वसनीय गैर-शल्य उपचारों में से एक है।

इस उपचार के बारे में

दवा (अक्सर **alprostadil**, या **bimix** / **trimix** नामक मिश्रण) लिंग के स्तंभन कक्षों में रक्त वाहिकाओं को शिथिल करती है। यह **उत्तेजना हो या न हो**, दोनों में काम करती है और आमतौर पर **5–15 मिनट** में स्तंभन होता है जो लगभग 30–60 मिनट तक रहता है।

- आपकी **पहली खुराक क्लिनिक में दी जाती है** ताकि सही मात्रा तय हो और सुरक्षा सुनिश्चित हो।
- फिर आपको **घर पर खुद इंजेक्शन देना** सिखाया जाता है।
- यह प्रोस्टेट सर्जरी के बाद भी प्रभावी हो सकता है, जब गोलियाँ काम न करें।

क्या यह सुरक्षित है?

अधिकांश पुरुषों के लिए हाँ — जब खुराक सावधानी से तय की जाए। सबसे ज़रूरी जोखिम है **4 घंटे से अधिक स्तंभन (priapism)**, जो एक आपात स्थिति है। अन्य प्रभावों में हल्का दर्द, कभी-कभी नील, और समय के साथ इंजेक्शन स्थान पर कठोर धब्बे (निशान) शामिल हैं — स्थान बदलते रहने से यह कम होता है।

शब्दों को समझें

स्तंभन दोष (ED)

संभोग के लिए पर्याप्त स्तंभन न होना।

Intracavernosal

लिंग के स्तंभन कक्षों (corpora cavernosa) के अंदर।

Alprostadil

ED के लिए सामान्य एकल-दवा इंजेक्शन।

Trimix / bimix

इंजेक्शन के लिए दो या तीन दवाओं का मिश्रण।

Titration

सही खुराक तय करना, आमतौर पर क्लिनिक में।

Priapism

4 घंटे से अधिक स्तंभन — चिकित्सा आपात स्थिति।

PDE5 inhibitors

ED की गोलियाँ (जैसे sildenafil); जब ये काम न करें तो ICI एक विकल्प है।

क्या इसमें दर्द होगा? सुई बहुत पतली होती है और लिंग के किनारे में जाती है जहाँ अधिकांश पुरुषों को केवल हल्की चुभन महसूस होती है। alprostadil के साथ बाद में हल्का दर्द सामान्य है। आपकी टीम पहली खुराक के समय निगरानी करेगी।

सुरक्षित तरीके से कैसे उपयोग करें

- 1 **पहली खुराक क्लिनिक में** तय होती है — खुराक खुद कभी न बढ़ाएँ।
- 2 लिंग के **किनारे में इंजेक्शन दें** (3 या 9 बजे की दिशा में); **ऊपर और नीचे से बचें** और हर बार **दिशा बदलें**।
- 3 नील से बचने के लिए उस स्थान पर कुछ मिनट दबाकर रखें।
- 4 टीम की सलाह से अधिक उपयोग न करें — आमतौर पर 24 घंटे में एक बार और सप्ताह में 3 बार से अधिक नहीं।

तैयारी कैसे करें

- दवा को निर्देशानुसार रखें (कुछ मिश्रणों को ठंडा रखना होता है)।
- अपनी टीम को **blood thinners** और हृदय की किसी भी स्थिति के बारे में बताएँ।
- यदि आसानी हो तो training में साथी को लाएँ।

यदि आपको ये हों तो अपनी चिकित्सा टीम को बुलाएँ:

- स्तंभन **4 घंटे से अधिक** रहे (priapism) — तुरंत emergency में जाएँ; देर से स्थायी नुकसान हो सकता है
- इंजेक्शन स्थान पर तेज़ दर्द, अधिक रक्तस्राव, या संक्रमण के लक्षण
- खुराक के बाद चक्कर आना या सीने में दर्द

जानने योग्य बातें

- टीम द्वारा दी गई खुराक और समय की जानकारी अपने पास रखें।
- लिंग में कोई नई कठोर गाँठ या टेढ़ापन हो तो बताएँ।

याद रखने योग्य तीन बातें

1. ICI में एक छोटी सुई से लिंग के किनारे में दवा दी जाती है, जो 5–15 मिनट में विश्वसनीय स्तंभन देती है — जब गोलियाँ काम न करें।
2. पहली खुराक क्लिनिक में तय होती है; खुद खुराक न बढ़ाएँ, इंजेक्शन की दिशा बदलते रहें, और दी गई सीमा से अधिक उपयोग न करें।
3. **4 घंटे से अधिक स्तंभन आपात स्थिति है** — तुरंत emergency में जाएँ।