

मिड-यूरेथ्रल स्लिंग (तनाव असंयम के लिए)

रोगी जानकारी · तनाव मूत्र असंयम के लिए एक त्वरित और प्रभावी सर्जरी

WARWIKI

मिड-यूरेथ्रल स्लिंग महिला तनाव मूत्र असंयम (SUI) के लिए सबसे आम सर्जरी है — खाँसने, हँसने, वज़न उठाने या व्यायाम के दौरान पेशाब का रिसाव। मूत्रमार्ग के मध्य भाग के नीचे एक पतली मुलायम mesh की पट्टी रखी जाती है ताकि दबाव पड़ने पर मूत्रमार्ग बंद रहे। यह जल्दी होती है, आमतौर पर उसी दिन घर जाते हैं, और बहुत असरदार व दीर्घकालिक है।

इस प्रक्रिया के बारे में

योनि के अंदर एक छोटे चीरे से एक पतली पट्टी मूत्रमार्ग के मध्य भाग के नीचे **बिना तनाव के** झूले की तरह रखी जाती है। खाँसने या ज़ोर लगाने पर मूत्रमार्ग स्लिंग पर टिकता है और बंद रहता है। बाद में इसे **चलाने की ज़रूरत नहीं** — यह अपने आप काम करती है।
अलग-अलग रास्ते (retropubic और transobturator) और छोटी “mini” sling भी होती हैं; आपका सर्जन आपके लिए सबसे उपयुक्त चुनेगा।

Mesh के बारे में

मिड-यूरेथ्रल sling महिला स्वास्थ्य में सबसे **अधिक अध्ययन की गई** प्रक्रियाओं में से एक है, जिसकी दीर्घकालिक सुरक्षा और सफलता दर उच्च है। यह **अलग** है उस transvaginal mesh से जिस पर FDA ने चेतावनी दी थी। यदि आप synthetic mesh से बचना चाहती हैं, तो **आपके अपने ऊतक** (autologous fascial sling) से बनी sling एक विकल्प है।

शब्दों को समझें

तनाव असंयम

दबाव से रिसाव — खाँसना, हँसना, वज़न उठाना।

मिड-यूरेथ्रल sling

मूत्रमार्ग के मध्य को सहारा देने वाली mesh पट्टी।

Tension-free

Sling मूत्रमार्ग के नीचे दबाव डाले बिना टिकती है।

Retropubic / transobturator

Sling के दो रास्ते; दोनों प्रभावी हैं।

Autologous sling

Mesh के बजाय आपके अपने ऊतक से बनी sling।

Mesh exposure

एक असामान्य समस्या जिसमें थोड़ी mesh दिखने लगती है; इलाज संभव है।

क्या इसमें दर्द होगा? यह एनेस्थीसिया (जनरल या spinal) के तहत होती है, इसलिए दौरान कुछ महसूस नहीं होता; आमतौर पर 30 मिनट से कम लगती है। अधिकतर लोग **उसी दिन घर** जाते हैं और हल्की तकलीफ के साथ जल्दी सामान्य गतिविधि पर लौटते हैं।

तैयारी कैसे करें

- **एनेस्थीसिया के निर्देश** मानें (खाली पेट रहें, बताई गई blood thinner दवाएँ बंद करें)।
- संक्रमण जाँच के लिए **urine test**; कभी-कभी पहले मूत्राशय की कार्य-क्षमता की जाँच।
- घर जाने के लिए किसी को साथ लाएँ; कुछ हफ्ते हल्का काम ही करें।

क्या होता है

- 1 आप सोई हुई या सुन्न होती हैं; antibiotics दी जाती हैं।
- 2 योनि में छोटा चीरा लगाकर पट्टी मूत्रमार्ग के नीचे बिना तनाव के रखी जाती है।
- 3 छोटे निकास बिंदु (पेट के ऊपर या जाँघ में) अपने आप बंद हो जाते हैं; योनि का चीरा बंद किया जाता है।
- 4 घर जाने से पहले आमतौर पर एक बार पेशाब करके देखा जाता है कि मूत्राशय खाली हो रहा है।

बाद में

- हल्की तकलीफ और थोड़ा रक्तस्राव सामान्य है।
- **लगभग 6 हफ्ते तक भारी सामान न उठाएँ, ज़ोर न लगाएँ, और संभोग से बचें।**
- शुरू में पेशाब धीमा हो तो कभी-कभी थोड़े समय के लिए catheter की ज़रूरत हो सकती है।

यदि आपको ये हों तो अपनी चिकित्सा टीम को बुलाएँ:

- आप **पेशाब न कर पाएँ** या मूत्राशय खाली न हो रहा हो
- बुखार या अधिक रक्तस्राव
- दर्द बढ़े, या बाद में संभोग में दर्द या योनि से स्राव (mesh की समस्या हो सकती है)

याद रखने योग्य तीन बातें

1. मिड-यूरेथ्रल sling मूत्रमार्ग को सहारा देकर तनाव रिसाव रोकती है — त्वरित, एक दिन में, बहुत प्रभावी, बाद में कुछ चलाने की ज़रूरत नहीं।
2. इसकी mesh अच्छी तरह अध्ययन की हुई है और वापस ली गई prolapse mesh से अलग है; पसंद हो तो अपने ऊतक की sling भी विकल्प है।
3. ~6 हफ्ते भारी काम और संभोग न करें। पेशाब न हो, बुखार आए, या दर्द/स्राव हो तो तुरंत बुलाएँ।