

PDE5 अवरोधक (ED & प्रोस्टेट की गोलियाँ)

WARWIKI

रोगी जानकारी · स्तंभन दोष और प्रोस्टेट के मूत्र लक्षणों की गोलियाँ

PDE5 अवरोधक (inhibitors) गोलियाँ हैं जो स्तंभन दोष (ED) के इलाज में काम आती हैं। इनमें से एक (tadalafil) बड़े हुए प्रोस्टेट के मूत्र लक्षणों में भी आराम देती है। सामान्य नाम हैं: **sildenafil (Viagra)**, **tadalafil (Cialis)**, **varde​nafil**, और **avanafil**। ये गोलियाँ उत्तेजना के जवाब में स्तंभन पाने में मदद करती हैं — अपने आप स्तंभन नहीं बनातीं।

यह कैसे काम करती है

ये दवाएँ लिंग की **रक्त वाहिकाओं को शिथिल** करती हैं ताकि रक्त प्रवाह हो सके। ज़रूरी बात यह है कि ये **केवल यौन उत्तेजना के साथ** काम करती हैं — आपको उत्तेजित होना ज़रूरी है; गोली खुद-ब-खुद स्तंभन नहीं देती। Tadalafil प्रोस्टेट और मूत्राशय की माँसपेशी भी ढीली करती है, इसलिए कम रोज़ाना खुराक से मूत्र प्रवाह बेहतर हो सकता है।

क्या उम्मीद करें

- **Sildenafil / vardenafil / avanafil** लगभग **30–60 मिनट** में असर करती हैं और कुछ घंटे चलती हैं।
- **Tadalafil** लंबे समय तक असर करती है (लगभग 36 घंटे — "वीकेंड" विकल्प) या **रोज़ाना कम खुराक** में ली जा सकती है।
- भारी, चिकना भोजन sildenafil का असर **देर से** कर सकता है; tadalafil पर खाने का असर नहीं होता।
- सही खुराक और समय खोजने में कुछ बार लग सकते हैं।

शब्दों को समझें

PDE5 अवरोधक

ED के लिए गोलीयों का वर्ग (sildenafil, tadalafil आदि)।

स्तंभन दोष (ED)

सेक्स के लिए पर्याप्त स्तंभन न मिलना या बनाए न रख पाना।

Nitrates

दिल/सीने के दर्द की दवाएँ जिन्हें इन गोलीयों के साथ कभी नहीं लेना है।

ज़रूरत पर बनाम रोज़ाना

सेक्स से पहले लें, या हर दिन कम खुराक।

BPH

बढ़ा हुआ प्रोस्टेट; tadalafil इसके मूत्र लक्षण भी ठीक करती है।

Priapism

4 घंटे से अधिक चलने वाला स्तंभन — चिकित्सा आपात स्थिति।

सबसे ज़रूरी नियम ये गोलियाँ **nitrates** (जैसे nitroglycerin या isosorbide, सीने के दर्द के लिए) या “poppers” (amyl nitrite) के साथ कभी न लें। इनका मेल **खतरनाक, यहाँ तक कि जानलेवा रक्तचाप गिरावट** कर सकता है। हर डॉक्टर को बताएँ कि आप PDE5 अवरोधक लेते हैं।

कैसे लें

- **निर्देशानुसार लें** — सेक्स से पहले (ज़रूरत पर) या रोज़ाना, जैसा नुस्खा हो।
- ज़रूरत पर sildenafil के लिए, **अपेक्षाकृत खाली पेट** लें ताकि असर जल्दी हो।
- जब तक न कहा जाए, 24 घंटे में एक से अधिक खुराक न लें।

ज़रूरी सुरक्षा

- **Nitrates या poppers नहीं** — कभी नहीं (ऊपर देखें)।
- **Alpha blockers** और अन्य रक्तचाप दवाओं के साथ सावधानी (चक्कर आ सकते हैं) — आपकी टीम इन्हें समायोजित करेगी।
- यदि **गंभीर हृदय रोग** है, तो डॉक्टर से पुष्टि करें कि सेक्स और ये गोलियाँ आपके लिए सुरक्षित हैं।
- **शराब** सीमित रखें, जो चक्कर बढ़ाती है।

सामान्य दुष्प्रभाव

- सिरदर्द, चेहरे पर **लालिमा**, नाक बंद, अपच
- पीठ या माँसपेशियों में दर्द (tadalafil से अधिक)
- नज़र में अस्थायी **नीला आभास** (sildenafil/vardenafil)

तुरंत आपात देखभाल लें यदि:

- स्तंभन **4 घंटे से अधिक** रहे (priapism)
- **अचानक दृष्टि या श्रवण हानि** — गोली बंद करें और देखभाल लें
- **सीने में दर्द**, बेहोशी, या तेज़ चक्कर

याद रखने योग्य तीन बातें

1. PDE5 अवरोधक **उत्तेजना के साथ** स्तंभन पाने में मदद करते हैं (अकेले काम नहीं करते); tadalafil प्रोस्टेट के मूत्र लक्षणों में भी मदद करती है।
2. **Nitrates या poppers के साथ कभी न लें** — रक्तचाप गिरावट जानलेवा हो सकती है।
3. 4 घंटे से अधिक स्तंभन, या अचानक दृष्टि/श्रवण हानि पर तुरंत आपात देखभाल लें।