

मूत्राशय नियंत्रण के लिए दो सबसे प्रभावी उपाय जिनमें दवा या सर्जरी की ज़रूरत नहीं: पेल्विक फ़्लोर मांसपेशी व्यायाम (जिन्हें Kegels भी कहते हैं) मूत्र रोकने वाली मांसपेशियों को मज़बूत करते हैं, और मूत्राशय प्रशिक्षण मूत्राशय को अधिक देर तक प्रतीक्षा करने का अभ्यास कराता है। नियमित रूप से करने पर ये तनाव रिसाव, तीव्र इच्छा और बार-बार पेशाब में मदद करते हैं — और ये निःशुल्क व सुरक्षित हैं।

ये कैसे मदद करते हैं

- **पेल्विक फ़्लोर व्यायाम** मूत्राशय और मूत्रमार्ग के नीचे की मांसपेशियों को सहारा देते हैं, जिससे खाँसने, उठाने या व्यायाम करने पर रिसाव कम होता है — और तीव्र इच्छा को भी दबाने में मदद मिलती है।
- **मूत्राशय प्रशिक्षण** धीरे-धीरे शौचालय जाने के बीच का समय बढ़ाता है, अति सक्रिय मूत्राशय (OAB) को शांत करता है और बार-बार पेशाब कम करता है।

सही मांसपेशियाँ पहचानें

पेल्विक फ़्लोर मांसपेशियाँ वही हैं जिनसे आप **पेशाब की धारा रोकते** या गैस रोकते हैं। उन्हें दबाएँ और ऊपर उठाएँ — **बिना** पेट, नितंब या जाँघ को कसे, और **साँस रोके बिना**। (पेशाब रोककर अभ्यास न करें — यह केवल मांसपेशी पहचानने का तरीका है।) यदि आप इन्हें नहीं पहचान पा रहे, तो **पेल्विक फ़्लोर physical therapist** मदद कर सकते हैं, कभी-कभी biofeedback से।

शब्दों को समझें

पेल्विक फ़्लोर

मूत्राशय, आँत और (महिलाओं में) गर्भाशय को सहारा देने वाली मांसपेशियों का समूह।

Kegels

पेल्विक फ़्लोर मांसपेशियों के लिए दबाने-उठाने के व्यायाम।

मूत्राशय प्रशिक्षण

शौचालय जाने के बीच का समय धीरे-धीरे बढ़ाना।

तीव्र इच्छा नियंत्रण

अचानक आई इच्छा को शांत करना ताकि रिसाव के बिना शौचालय पहुँच सकें।

Biofeedback

एक उपकरण जो दिखाता है कि आप सही मांसपेशी उपयोग कर रहे हैं।

पेल्विक फ़्लोर PT

इन मांसपेशियों में विशेषज्ञ therapist।

परिणाम कब दिखेगा? समय दें — नियमित अभ्यास से अधिकांश लोग **6–12 सप्ताह** में सुधार देखते हैं, और निरंतरता से और बेहतर होता है। किसी भी व्यायाम की तरह, रुकने पर लाभ कम हो जाता है — इसे रोज़ की आदत बनाएँ।

सरल दैनिक दिनचर्या

- 1 पेल्विक फ़्लोर मांसपेशियों को **दबाएँ** और 3–5 सेकंड रोकें, फिर उतने ही समय के लिए पूरी तरह **ढीला छोड़ें**।
- 2 लगभग **10 बार** दोहराएँ, और **दिन में 3 बार** करें। जैसे-जैसे मज़बूत हों, रोकने का समय बढ़ाएँ।
- 3 कुछ **तेज़ मज़बूत दबाव** भी जोड़ें — खाँसने, छींकने या उठाने से ठीक पहले उपयोग करें ("the knack")।
- 4 दो दबावों के बीच पूरी तरह ढीला छोड़ना उतना ही ज़रूरी है जितना दबाना।

मूत्राशय प्रशिक्षण

- अपना पैटर्न समझने के लिए एक **मूत्राशय डायरी** रखें।
- जब तीव्र इच्छा हो, **रुकें, पेल्विक फ़्लोर दबाएँ, साँस लें और इच्छा शांत होने दें** — फिर शांति से शौचालय जाएँ।
- शौचालय जाने के बीच का समय 15-15 मिनट बढ़ाते हुए हर 3–4 घंटे तक पहुँचें।

उपयोगी बातें

- ये **कहीं भी** किए जा सकते हैं — किसी को पता नहीं चलता।
- नियमितता तीव्रता से बेहतर है; खाने या सिग्नल जैसे दैनिक संकेतों से जोड़ें।
- यदि **पेल्विक दर्द** हो या मांसपेशियाँ बहुत कसी हों, तो लक्ष्य मज़बूत करना नहीं बल्कि **ढीला करना** हो सकता है — अपनी टीम से पूछें।

अपनी चिकित्सा टीम से पूछें यदि:

- आप पहचान नहीं पा रहे कि सही मांसपेशी उपयोग हो रही है
- व्यायाम से **दर्द बढ़े** या दबाव महसूस हो
- कुछ महीने बाद भी कोई सुधार न दिखे

याद रखने योग्य तीन बातें

1. पेल्विक फ़्लोर व्यायाम और मूत्राशय प्रशिक्षण रिसाव, तीव्र इच्छा और बार-बार पेशाब के लिए सुरक्षित, निःशुल्क और प्रभावी प्रथम उपाय हैं।
2. सही मांसपेशी दबाएँ (साँस रोके बिना), बीच में पूरी तरह ढीला छोड़ें, और मूत्राशय को थोड़ा और प्रतीक्षा करना सिखाएँ।
3. 6–12 सप्ताह दें और जारी रखें। यदि दर्द बढ़े या मांसपेशी न मिले, तो पेल्विक फ़्लोर physical therapy के बारे में पूछें।