

Injectons intracaverneuses (Injections pénienness pour la DE)

WARWIKI

Information pour le patient · Traitement auto-injectable pour la dysfonction érectile

L'injection intracaverneuse (ICI) est un traitement de la dysfonction érectile (DE) : vous injectez une petite quantité de médicament sur le côté du pénis à l'aide d'une aiguille très fine pour produire une érection. Elle est utilisée lorsque les comprimés ne fonctionnent pas ou ne conviennent pas. L'idée peut sembler intimidante, mais l'aiguille est très petite, la plupart des hommes ressentent peu de chose, et il s'agit de l'un des traitements non chirurgicaux les plus fiables.

À propos de ce traitement

Le médicament (souvent de l'**alprostadil**, ou un mélange préparé appelé **bimix** ou **trimix**) détend les vaisseaux sanguins des corps érectiles afin que le sang y afflue. Il agit **que vous soyez excité ou non**, produisant généralement une érection en **5 à 15 minutes** environ, qui dure environ 30 à 60 minutes.

- La **première dose est administrée au cabinet** pour trouver la quantité appropriée et s'assurer qu'elle est sans danger pour vous.
- On vous apprend ensuite à **vous injecter vous-même à domicile**.
- Elle est souvent efficace même lorsque les comprimés ont échoué, notamment après une chirurgie de la prostate.

Est-ce sans danger ?

Pour la plupart des hommes, oui — lorsque la dose est soigneusement déterminée. Le risque le plus important est une **érection prolongée (priapisme)** durant plus de 4 heures, qui constitue une urgence médicale. Les autres effets comprennent de légères douleurs, des ecchymoses occasionnelles et, avec le temps, des zones durcies (cicatrices) aux points d'injection — alterner les côtés aide à prévenir cela.

COMPRENDRE LES TERMES

Dysfonction érectile (DE)

Difficulté à obtenir ou à maintenir une érection suffisamment ferme pour les rapports sexuels.

Intracaverneux

À l'intérieur des corps érectiles (corpora cavernosa) du pénis.

Alprostadil

Médicament injectable unique couramment utilisé contre la DE.

Trimix / bimix

Mélange préparé de deux ou trois médicaments utilisé en injection.

Titration

Détermination de votre dose correcte, généralement débutée au cabinet.

Priapisme

Érection prolongée anormale durant plus de 4 heures — urgence médicale.

Inhibiteurs de la PDE5

Comprimés érectiles (comme le sildénafil) ; l'ICI est une option quand ceux-ci échouent.

EST-CE QUE ÇA FAIT MAL ? L'aiguille est très fine et pénètre sur le côté de la verge, là où la plupart des hommes ne ressentent qu'une légère piqûre — et non sur la partie supérieure ou le dessous, plus sensibles. Une légère gêne après l'injection est fréquente, surtout avec l'alprostadil. Votre équipe surveillera votre première dose pour s'assurer qu'elle est confortable et sans danger.

Comment l'utiliser en toute sécurité

- 1 **Première dose au cabinet** pour déterminer la bonne quantité — n'augmentez jamais la dose vous-même.
- 2 Injectez sur le **côté de la verge** (position 3 heures ou 9 heures) ; **évit**ez le dessus et le dessous, et **alternez les côtés** à chaque fois.
- 3 Appuyez fermement sur le site pendant quelques minutes pour limiter les ecchymoses.
- 4 Utilisez-le **au maximum selon les recommandations de votre équipe** — en général, pas plus d'une fois toutes les 24 heures ni environ 3 fois par semaine.

Avant de commencer

- Conservez le médicament selon les instructions (certains mélanges nécessitent une réfrigération).
- Informez votre équipe de tout **anticoagulant** et de tout problème cardiaque.
- Amenez un partenaire à la séance d'apprentissage si cela vous aide.

Consultez en urgence si :

- Une érection dure **plus de 4 heures** (priapisme) — rendez-vous aux urgences ; attendre peut causer des lésions permanentes
- Vous avez une douleur intense, un saignement abondant ou des signes d'infection au site d'injection
- Vous vous sentez défaillir ou avez des douleurs thoraciques après une dose

Bon à savoir

- Ayez toujours sur vous les informations sur la dose et le calendrier que votre équipe vous a remises.
- Signalez tout nouveau nodule dur ou toute courbure du pénis.

TROIS CHOSES À RETENIR

1. L'ICI utilise une aiguille très fine pour introduire un médicament sur le côté du pénis, produisant une érection fiable en environ 5 à 15 minutes — utile lorsque les comprimés ne fonctionnent pas.
2. Votre première dose est déterminée au cabinet ; n'augmentez jamais la dose vous-même, alternez les côtés d'injection et ne dépassez pas la limite fixée.
3. Une érection durant **plus de 4 heures est une urgence médicale** — rendez-vous immédiatement aux urgences.