

Implant pénien malléable

WARWIKI

Information pour le patient · Un implant semi-rigide pour la dysfonction érectile

Un implant pénien malléable — aussi appelé implant semi-rigide — est une paire de tiges souples et fermes placées à l'intérieur du pénis, pour les hommes dont la dysfonction érectile (DE) n'a pas répondu aux médicaments, aux injections ou aux autres traitements. Il n'y a rien à pomper : il suffit de plier le pénis vers le haut pour les rapports et vers le bas pour le dissimuler. Cette fiche explique le fonctionnement, la préparation et le déroulement.

À propos de cette intervention

Quand la **dysfonction érectile (DE)** ne répond pas aux médicaments, au dispositif à vide ou aux injections, un implant est l'étape suivante la plus fiable. L'implant malléable est le type le plus simple : deux tiges à revêtement souple sont placées dans le pénis. Il reste suffisamment ferme pour les rapports en permanence, et vous le positionnez à la main :

- Pliez-le vers le **haut** pour les rapports sexuels
- Pliez-le vers le **bas** pour le dissimuler sous les vêtements

Sans pompe, réservoir ni liquide, c'est le type d'implant **le plus simple à utiliser et le plus durable** — un bon choix si l'utilisation d'une pompe serait difficile (par exemple, en cas de force manuelle réduite).

Ce qu'il faut savoir

Comme tout implant pénien, c'est un **choix permanent** : la pose modifie le tissu érectile, de sorte que les érections naturelles et les autres traitements de la DE (médicaments, injections) ne fonctionneront plus. Il ne **modifie pas la miction, la sensibilité, l'orgasme ni l'éjaculation**. Principal compromis par rapport au type gonflable : le pénis reste ferme en permanence, ce qui peut rendre la dissimulation un peu moins aisée et la sensation moins naturelle — mais l'implant malléable est plus simple et plus durable.

COMPRENDRE LES TERMES

Dysfonction érectile (DE)

Difficulté à obtenir ou maintenir une érection suffisante pour les rapports.

Implant pénien

Dispositif placé dans le pénis pour permettre des érections quand les autres traitements ont échoué.

Malléable / semi-rigide

Implant souple qui maintient le pénis ferme ; vous le positionnez à la main, sans pompe.

Implant gonflable

L'autre type principal — une pompe le gonfle et le dégonfle ; plus naturel, mais plus de composants.

Dissimulation

Plier le pénis vers le bas pour que l'implant ne soit pas visible sous les vêtements.

Anesthésie générale

Médicament qui vous maintient endormi et sans douleur pendant l'intervention.

Durable

Long-lasting — sans pièces contenant du liquide, peu d'usure ou de défaillance possible.

EST-CE QUE ÇA FAIT MAL ? L'intervention se fait sous anesthésie générale ou rachianesthésie : vous ne sentez rien. Ensuite, le pénis et le scrotum sont sensibles, gonflés et marqués d'ecchymoses pendant une à deux semaines — suspensoir, glace et antidouleurs soulagent. L'intervention est courte (souvent moins d'une heure), généralement en ambulatoire.

Comment vous préparer (avant l'intervention)

- Réalisée sous **anesthésie générale ou rachianesthésie** — suivez toutes les instructions chirurgicales (jeûne, médicaments à suspendre, y compris les anticoagulants).
- **La prévention des infections est essentielle pour un implant** : toute infection (y compris urinaire) doit être traitée au préalable ; vous vous douchez avec un savon antiseptique et recevez des antibiotiques.
- **Ne fumez pas et n'utilisez pas de vapotage** ; si vous avez du **diabète**, votre équipe s'assurera que votre glycémie est bien contrôlée — ces deux mesures réduisent le risque infectieux.

Informez votre équipe à l'avance si vous :

- Avez du **diabète** ou toute affection affectant la cicatrisation
- Avez eu une chirurgie pelvienne ou pénienne, une radiothérapie, ou un implant antérieur

Déroulement de l'intervention

- 1 Vous êtes endormi ou insensibilisé de la taille vers le bas sous anesthésie, et des antibiotiques vous sont administrés.
- 2 Par une petite incision, le chirurgien place **une tige souple dans chacun des deux corps caverneux** du pénis. Il n'y a pas de pompe ni de réservoir.
- 3 L'incision est fermée et le pénis est laissé positionné vers le bas. Une sonde peut être placée brièvement.

Après l'intervention

- Portez un suspensoir, appliquez de la glace, prenez des antidouleurs et gardez l'incision propre et sèche.
- **N'utilisez pas l'implant pour les rapports avant l'accord de votre chirurgien** — en général après **4–6 semaines**, une fois la cicatrisation complète.
- Une fois guéri, **aucune pompe à apprendre** — pliez le pénis vers le haut pour l'utiliser, vers le bas pour le dissimuler. Votre équipe vous montrera.

Appelez votre équipe soignante si vous avez :

- De la fièvre ou des frissons, ou une rougeur, douleur, gonflement ou écoulement croissant au niveau de l'incision
- Une impossibilité d'uriner
- Une douleur intense ou croissante, ou un pénis de couleur sombre ou livide

TROIS CHOSES À RETENIR

1. Un implant malléable, ce sont deux tiges souples dans le pénis — pliez vers le haut pour les rapports, vers le bas pour dissimuler. Pas de pompe ; c'est le type le plus simple et le plus durable.
2. C'est un **choix permanent** (érections naturelles et médicaments/injections ne fonctionneront plus), mais il ne **modifie pas la miction, la sensibilité, l'orgasme ni l'éjaculation**.
3. La prévention des infections est primordiale : traitez toute infection, ne fumez pas, contrôlez le diabète, utilisez le savon antiseptique et les antibiotiques. N'utilisez pas l'implant avant l'accord de votre chirurgien (~4–6 semaines).