

Nycturie

Information pour le patient · Se réveiller la nuit pour uriner — pourquoi cela arrive et comment l'améliorer

WARWIKI

La nycturie (nocturia) correspond au fait de se réveiller une fois ou plus pendant la nuit pour uriner. C'est très fréquent, surtout en vieillissant, mais ce n'est pas une fatalité — cela perturbe le sommeil, entraîne une fatigue diurne et augmente le risque de chutes nocturnes. La plupart des causes sont traitables dès qu'on les identifie.

À propos de cette affection

Il existe trois grandes raisons pour lesquelles on se réveille la nuit pour uriner, et beaucoup de personnes en cumulent **plusieurs** :

- **Produire trop d'urine la nuit** (polyurie nocturne) — en raison de boissons en soirée, de caféine ou d'alcool, d'un œdème des jambes, de problèmes cardiaques ou rénaux, d'apnée du sommeil, ou de diurétiques.
- **Une vessie qui retient moins** — due à une vessie hyperactive ou à une hypertrophie de la prostate.
- **Un sommeil perturbé** — vous vous réveillez pour une autre raison, puis décidez d'uriner.

Pourquoi c'est important

Au-delà du mauvais sommeil, se lever la nuit est une cause fréquente de **chutes et de fractures** chez les personnes âgées. Parce que la nycturie pointe souvent vers un problème traitable (parfois une apnée du sommeil ou un trouble cardiaque), il vaut mieux l'explorer plutôt que l'ignorer.

COMPRENDRE LES TERMES

Nycturie

Se réveiller du sommeil pour uriner.

Polyurie nocturne

Produire une grande partie de son urine quotidienne pendant la nuit.

Journal mictionnel

Relevé des moments et volumes d'urine produits, jour et nuit.

Vessie hyperactive

Une vessie qui envoie des signaux urgents et retient moins d'urine.

Apnée du sommeil

Trouble respiratoire nocturne pouvant augmenter la production d'urine la nuit.

Desmopressine

Médicament qui réduit la production d'urine nocturne chez certains patients.

LA PREMIÈRE ÉTAPE : UN JOURNAL MICTIONNEL Tenir un **journal mictionnel** pendant quelques jours — noter quand et combien vous buvez et urinez, de jour comme de nuit — est la démarche la plus utile que vous puissiez faire. Cela indique à votre équipe **quelle** cause est à l'origine de votre nycturie, ce qui oriente le traitement.

Comment on le diagnostique

- Un **journal mictionnel** et un bilan de vos boissons, médicaments et sommeil
- Une **analyse d'urine** et la recherche d'une hypertrophie de la prostate ou d'une vessie hyperactive
- Un dépistage d'un **œdème des jambes, d'une apnée du sommeil** ou d'une cause cardiaque ou rénale si nécessaire

Comment on le traite

- 1 **Habitudes du soir** — limiter les boissons, la caféine et l'alcool dans les 3 à 4 heures avant le coucher.
- 2 **En cas d'œdème des jambes** — surélever les jambes l'après-midi, porter des bas de contention et prendre les diurétiques plus tôt dans la journée (selon prescription).
- 3 **Traiter la cause vésicale** — vessie hyperactive ou hypertrophie de la prostate.
- 4 **Médicament ciblé ou traitement du sommeil** — par exemple, la desmopressine en cas de surproduction nocturne avérée, ou le traitement d'une apnée du sommeil.

Sécurité nocturne

- Utilisez une **veilleuse** et gardez le chemin vers la salle de bain dégagé pour éviter les chutes.
- Levez-vous lentement, surtout si vous prenez des médicaments contre l'hypertension.

Appelez votre équipe soignante si vous avez :

- **Du sang dans les urines**, des brûlures ou de la fièvre (infection possible)
- Sous desmopressine : **nausées, maux de tête ou confusion** (possible hyponatrémie)
- Un gonflement, un essoufflement ou un changement important de votre volume urinaire

TROIS CHOSES À RETENIR

1. La nycturie — se réveiller pour uriner — est fréquente, perturbe le sommeil et augmente le risque de chutes ; elle a généralement une cause traitable.
2. Quelques jours de journal mictionnel sont l'étape clé pour identifier la cause et le bon traitement.
3. Réduisez les boissons du soir, gérez l'œdème des jambes et traitez la cause vésicale ou du sommeil. Prévenez les chutes nocturnes avec une veilleuse et un chemin dégagé.