

# Optilume (ballon enduit de médicament)

Information pour le patient · Un traitement par ballon actif pour le rétrécissement de l'urètre

WARWIKI

Optilume est un traitement peu invasif pour le rétrécissement de l'urètre — le tube qui évacue l'urine hors de votre corps. Un ballon spécial dilate doucement la zone rétrécie et libère en même temps un médicament dans la paroi pour aider à empêcher la formation d'une nouvelle cicatrice. Il n'y a pas d'incision extérieure.

## À propos de cette intervention

Le **rétrécissement de l'urètre** est un segment cicatrisé et rétréci qui ralentit le jet urinaire. Le dilater ou l'inciser simplement laisse souvent le rétrécissement réapparaître. Optilume agit de deux façons à la fois :

- Un **ballon dilate** le segment cicatrisé.
- Un **revêtement médicamenteux (paclitaxel)** sur le ballon est délivré dans le tissu pour ralentir la reformation de la cicatrice.

C'est une bonne option pour certains **rétrécissements récidivants** de l'urètre bulbaire (sous le scrotum) qui sont **inférieurs à environ 3 cm** et qui sont réapparus après une dilatation ou une incision antérieure. C'est plus durable qu'une simple dilatation, mais ce **n'est pas une urétroplastie** (réparation chirurgicale ouverte), qui reste l'option la plus durable. Votre chirurgien vous expliquera ce qui est le mieux pour vous.

## Est-ce sans danger ?

Optilume est peu invasif et réalisé par l'urètre, souvent en ambulatoire. Il est généralement bien toléré. La dose de médicament est faible et reste locale. Les risques comprennent du sang dans les urines ou le sperme, une brève sensation de brûlure, une infection urinaire, et la possibilité que le rétrécissement réapparaisse avec le temps.

## COMPRENDRE LES TERMES

### Urètre

Le tube qui évacue l'urine hors du corps.

### Rétrécissement de l'urètre

Une zone cicatrisée et rétrécie de l'urètre qui ralentit le jet urinaire.

### Urètre bulbaire

La partie de l'urètre sous le scrotum, où ce traitement est le plus efficace.

### Ballon actif (enduit de médicament)

Un ballon qui dilate le rétrécissement et délivre un médicament dans la paroi.

### Paclitaxel

Le médicament sur le ballon qui aide à empêcher la cicatrice de se reformer.

### Dilatation

Élargissement d'un rétrécissement — ici, réalisé avec le ballon.

### Cystoscope

Une fine caméra utilisée pour repérer et évaluer le rétrécissement.

### Sonde

Un tube souple placé dans l'urètre pour un court temps après l'intervention.

**EST-CE QUE ÇA FAIT MAL ?** L'intervention est réalisée sous anesthésie ou sédation, vous ne ressentez donc rien pendant. Après, attendez-vous à de légères brûlures, une gêne pelvienne ou pénienne et un peu de sang dans les urines ou le sperme pendant quelques jours. Une sonde est généralement posée brièvement. C'est une intervention courte, souvent avec retour à domicile le jour même.

## Comment vous préparer (Avant l'intervention)

- Respectez les **consignes d'anesthésie ou de sédation** (jeûne et médicaments à suspendre, y compris les anticoagulants).
- Un **examen d'urine** vérifie l'absence d'infection — toute infection doit être traitée avant.
- **Prévoyez un accompagnant** pour le retour, et planifiez le port d'une sonde pour un court temps.

### Informez votre équipe à l'avance si vous :

- Prenez un **anticoagulant** ou avez une infection urinaire en cours
- Prévoyez de **concevoir un enfant** — en raison du médicament, on vous demandera d'utiliser un préservatif et d'éviter de concevoir pendant la période précisée par votre équipe

## Déroulement de l'intervention

- 1 Vous êtes endormi ou sédaté ; un cystoscope confirme la longueur et la localisation du rétrécissement.
- 2 Un fin fil-guide est passé à travers le rétrécissement, et la zone est pré-dilatée pour permettre l'introduction du ballon.
- 3 Le ballon actif est centré sur la cicatrice et gonflé pendant un temps défini, délivrant le médicament.
- 4 Le ballon et le cystoscope sont retirés, puis une sonde est posée brièvement.

## Après l'intervention

- La sonde est retirée après un **court délai** ; votre équipe vous indiquera quand.
- Attendez-vous à de **légères brûlures et des urines ou du sperme légèrement rosés** pendant quelques jours. Boire davantage d'eau aide.
- **Évitez les efforts intenses** brièvement, et revenez pour un contrôle du débit ou des symptômes.
- **Utilisez un préservatif** pendant la durée conseillée par votre équipe, en raison du médicament.

### Appelez votre équipe soignante si vous avez :

- De la fièvre ou des frissons
- L'**impossibilité d'uriner**, surtout après le retrait de la sonde
- Un saignement abondant ou des caillots dans les urines
- Une douleur qui s'aggrave au lieu de s'améliorer

## TROIS CHOSES À RETENIR

1. Optilume dilate le rétrécissement de l'urètre avec un ballon et délivre un médicament pour éviter la reformation de la cicatrice — une option endoscopique, non un substitut à l'urétroplastie ouverte.
2. Pour vous préparer : respectez les consignes de jeûne et de médicaments, traitez toute infection, prévoyez un accompagnant, et informez votre équipe si vous prévoyez de concevoir un enfant.
3. De légères brûlures et un peu de sang dans les urines ou le sperme pendant quelques jours sont normaux. Utilisez un préservatif pendant la durée conseillée.