

海綿體注射（陰莖注射治療 ED）

病人須知 · 一種自行注射治療勃起功能障礙嘅方法

WARWIKI

海綿體注射（ICI）係一種治療勃起功能障礙 (ED) 嘅方法，你用極幼嘅針將少量藥物注射入陰莖側面，令陰莖勃起。適合口服藥唔起效或唔適合服用嘅人。雖然聽落有啲嚇人，但針好細，大部分男士只係感覺到輕微刺痛，係最可靠嘅非手術治療之一。

關於呢個治療

藥物（通常係 **alprostadil**，或者複合配方嘅 **bimix** 或 **trimix**）會令陰莖勃起組織內嘅血管放鬆，令血液流入。**無論你有冇性衝動都有效**，一般約 **5-15 分鐘** 內勃起，持續約 30-60 分鐘。

- **首次劑量喺診所進行**，以確定合適份量及安全性。
- 之後你會學識**喺家自行注射**。
- 即使口服藥無效，包括前列腺手術後，ICI 通常都有效。

安唔安全？

對大多數男士嚟講係安全嘅 — 只要劑量調校得宜。最重要嘅風險係**長時間勃起（異常勃起）**超過 4 小時，呢個係緊急情況。其他影響包括輕微痠痛、偶爾瘀青，以及長期注射後注射位置出現硬塊（疤痕）— 輪流換位可預防呢個問題。

詞彙解釋

勃起功能障礙 (ED)

難以勃起或維持足夠硬度以進行性行為。

海綿體 (Intracavernosal)

即陰莖內嘅勃起組織（陰莖海綿體）。

Alprostadil

常用嘅單一成分 ED 注射藥物。

Trimix / Bimix

由兩種或三種藥物組成嘅複合注射配方。

劑量調校 (Titration)

喺診所確定你嘅正確劑量。

異常勃起 (Priapism)

勃起超過 4 小時 — 醫療緊急情況。

PDE5 抑制劑

口服勃起藥（如 sildenafil）；口服藥無效時可選用 ICI。

會唔會痛？ 針好幼，注射入陰莖側面，大部分男士只係感覺到輕微刺痛 — 唔係敏感嘅頂部或底部。之後輕微痠痛係常見嘅，alprostadil 尤其明顯。醫療團隊會喺首次注射時陪住你，確保舒適及安全。

點樣安全使用

- 1 首次劑量喺診所確定 — 唔好自行增加劑量。
- 2 注射入陰莖側面（約 3 點或 9 點鐘位置）；避開頂部及底部，每次左右交替換位。
- 3 注射後用手指按壓幾分鐘以減少瘀青。
- 4 使用頻率唔好超過醫療團隊建議 — 一般每 24 小時最多一次，每週約三次。

點樣準備

- 按指示保存藥物（部分複合配方需要冷藏）。
- 告知醫療團隊你有冇服用薄血藥及心臟病史。
- 如有需要，可以帶伴侶一齊學習注射方法。

如果你有以下情況，請即刻聯絡醫療團隊：

- 勃起超過 4 小時（異常勃起）— 立即去急症室，拖延可能造成永久損傷
- 注射位置有劇痛、大量出血或感染跡象
- 注射後感到頭暈或胸痛

其他要知道嘅事

- 隨身攜帶醫療團隊提供嘅劑量及時間資料。
- 如陰莖出現新嘅硬塊或彎曲，請告知醫生。

要記住嘅三件事

1. ICI 用極幼嘅針將藥物注射入陰莖側面，約 5–15 分鐘內可靠勃起 — 適合口服藥無效嘅情況。
2. 首次劑量喺診所確定；唔好自行增加劑量，每次輪流換位，唔好超過建議頻率。
3. 勃起超過 4 小時係緊急情況 — 立即去急症室。