

尿道中段吊帶手術（壓力性尿失禁）

病人須知 · 治療壓力性漏尿嘅快速有效手術

WARWIKI

尿道中段吊帶手術係治療女性壓力性尿失禁 (SUI) 最常見嘅手術 — 即係咳嗽、大笑、搬嘢或做運動時漏尿。手術會喺尿道中段下方放入一條幼軟網帶作支撐，令腹壓升高時尿道保持閉合。手術快捷，通常當日出院，效果顯著而且持久。

關於呢個手術

醫生會喺陰道內開一個小切口，將一條**無張力**網帶放喺尿道中段下方，就好似一個吊床。當你咳嗽或用力時，尿道會壓住吊帶從而保持閉合。術後**唔需要調校** — 吊帶會自動運作。手術有唔同入路（恥骨後入路同閉孔入路），亦有單切口「微型」吊帶；外科醫生會為你揀選最合適嘅方式。

關於網帶

合成尿道中段吊帶係女性健康範疇內**研究最充分**嘅手術之一，長期安全性同成效俱佳。佢同曾受 FDA 警告、用於脫垂手術嘅經陰道網片**唔同**。如果你唔想用合成網帶，可以考慮用**自身組織**製造嘅筋膜吊帶作替代。

詞彙解釋

壓力性尿失禁

喺腹壓升高時漏尿 — 如咳嗽、大笑、搬嘢。

尿道中段吊帶

支撐尿道中段嘅網帶。

無張力

吊帶放喺尿道下方，唔會夾緊尿道。

恥骨後 / 閉孔入路

網帶可以走嘅兩條路線，效果同樣良好。

自體筋膜吊帶

用自身組織代替網帶製造嘅吊帶。

網帶外露

少見問題，少量網帶露出；可以處理。

會唔會痛？ 手術係麻醉下進行（全身或脊椎麻醉），過程中你唔會有感覺，通常唔夠 30 分鐘完成。大多數人**當日可以返屋企**，之後只有輕微酸痛，很快可以恢復輕量活動。

點樣準備

- 跟從**麻醉指示**（禁食、按指示停止薄血藥）。
- 術前要做**尿液測試**排除感染；有時需要做膀胱功能測試。
- 安排人接送；預備休息輕度工作數星期。

會發生咩事

- 1 你會入睡或麻木；同時會注射抗生素。
- 2 在陰道開小切口，將網帶無張力地放喺尿道中段下方。
- 3 出口小切口（恥骨上方或腹股溝）會自行癒合；陰道切口縫合。
- 4 出院前通常需要先排尿，確認能夠正常排空膀胱。

之後

- 輕微酸痛同少量出血屬正常。
- **約 6 星期內避免重物、用力及性行為。**
- 如初期排尿較慢，偶爾需要短暫使用尿管。

如果你有以下情況，請即刻聯絡醫療團隊：

- 你**無法排尿**或感覺排唔乾淨
- 發燒或大量出血
- 疼痛加劇，或日後性交時痛楚 / 陰道分泌異常（可能係網帶問題）

要記住嘅三件事

1. 尿道中段吊帶支撐尿道以止漏 — 快捷、當日出院、效果顯著，術後唔需調校。
2. 呢種網帶經過充分研究，同被召回嘅脫垂網片唔同；如你唔想用網帶，自體筋膜吊帶係另一選擇。
3. 約 6 星期內避免重物及性行為。如無法排尿、發燒或日後出現疼痛/分泌異常，請聯絡醫療團隊。