

夜尿係指喺瞓覺期間，一晚醒來一次或以上去排尿。呢個情況好常見，尤其係年紀大嘅時候，但你唔需要默默接受 — 夜尿會影響睡眠、令你日間疲倦，仲會增加夜間跌倒嘅風險。只要找出原因，大多數情況都係可以治療嘅。

關於呢個病

夜尿有三個主要原因，好多人係混合幾個因素：

- **夜間製造太多尿液**（夜間多尿）— 因晚上飲太多液體、咖啡因或酒精、腳腫、心臟或腎臟問題、睡眠窒息症，或服用利尿藥。
- **膀胱容量減少** — 因膀胱過度活躍症 (OAB) 或前列腺增大。
- **睡眠受干擾** — 因其他原因醒咗，然後順便去廁所。

點解要重視

除咗影響睡眠，夜間起床係老年人**跌倒同骨折**嘅主要原因之一。夜尿往往反映可以治療嘅問題（有時係睡眠窒息症或心臟問題），值得認真評估，唔好忽視。

詞彙解釋

夜尿

喺瞓覺期間醒來去排尿。

夜間多尿

每日尿液嘅大部分係喺夜間製造。

排尿日記

記錄你喺日間同夜間排尿嘅時間同份量。

OAB

膀胱容易發出急迫尿意、容量減少。

睡眠窒息症

一種影響睡眠呼吸嘅疾病，可以引致夜間尿量增加。

Desmopressin

一種藥物，可減少適合使用嘅病人嘅夜間尿量。

第一步：記排尿日記 記錄幾日嘅**排尿日記** — 寫低你喺日間同夜間飲嘢同排尿嘅時間同份量 — 係你可以做到最有用嘅事。呢份記錄可以幫助醫療團隊找出**係哪個原因**導致你夜尿，從而決定治療方向。

點樣診斷

- **排尿日記**，同埋檢視你嘅飲食、藥物同睡眠習慣
- **尿液測試**，及檢查有冇前列腺增大或OAB
- 如有需要，篩查**腳腫**、**睡眠窒息症**或心臟/腎臟問題

點樣治療

- 1 **調整晚間習慣** — 喺瞓覺前 3–4 小時限制飲液體、咖啡因同酒精。
- 2 **處理腳腫** — 下午將腳抬高、穿壓力襪，並按指示提早服用利尿藥。
- 3 **治療膀胱問題** — 針對OAB或前列腺增大進行治療。
- 4 **針對性藥物或治療睡眠** — 例如真正夜間尿量過多可用 Desmopressin，或治療睡眠窒息症。

夜間安全

- 使用**夜燈**並保持去廁所嘅通道暢通，預防跌倒。
- 起身時慢慢站起，特別係服用血壓藥嘅人。

如果你有以下情況，請即刻聯絡醫療團隊：

- **小便有血**、灼熱感或發燒（可能係感染）
- 服用 Desmopressin 期間出現**噁心**、**頭痛**或**神志不清**（可能係低鈉）
- 腳腫、氣促，或排尿量有明顯變化

要記住嘅三件事

1. **夜尿** — 夜晚醒來排尿 — 係常見嘅問題，影響睡眠兼增加跌倒風險，通常都有可治療嘅原因。
2. 記幾日排尿日記係找出原因同選擇正確治療嘅關鍵第一步。
3. 調整晚間飲液習慣、處理腳腫、治療膀胱或睡眠問題，並用夜燈同清晰通道預防跌倒。