

膀胱過度活躍症 (OAB)

病人須知 · 了解突發尿急、頻繁如廁同漏尿

WARWIKI

膀胱過度活躍症（OAB）係一種常見、可以治療嘅病——膀胱肌肉喺唔應該收縮嘅時候收縮，令你有突然、強烈嘅尿急感，頻密地去廁所、夜間需要起身小便，有時甚至未到廁所就漏咗尿。呢個唔係正常老化嘅一部份，有好多方法可以改善。

關於呢個病

正常情況下，膀胱會平穩地充盈，等到差不多滿先發出訊號。OAB 係膀胱太早或太強烈地發出「尿急」訊號。主要症狀包括：

- **尿急** — 突然出現、難以控制嘅尿意
- **尿頻** — 每日小便超過約 8 次
- **夜尿** — 夜間需要起身小便
- **急迫性漏尿** — 趕去廁所途中有時會漏尿

成因

通常冇單一成因 — 主要係膀胱同大腦之間嘅神經訊號出現問題。可以誘發或加重症狀嘅因素包括**咖啡因****同酒精**、便秘、過重、某些藥物，以及（女性）更年期。尿道感染都可以引起類似症狀，所以要先排除。有時亦涉及神經系統問題。

詞彙解釋

膀胱過度活躍症 (OAB)

膀胱太早收縮引起嘅尿急同尿頻。

尿急

突然出現、強烈且難以忍耐嘅尿意。

尿頻

日間需要頻密地小便。

夜尿

夜間睡眠中需要起身小便。

急迫性尿失禁

伴隨強烈尿急而漏尿。

排尿日記

記錄飲水、如廁次數同漏尿情況嘅簡單記錄。

盆底

可以透過訓練加強、幫助控制膀胱嘅肌肉群。

膀胱訓練

逐漸延長如廁間距，以緩解尿急。

會唔會好返？ 係——大部份人都會改善。治療通常由簡單嘅生活調整同膀胱訓練開始，有需要先逐步加強。每個步驟要等幾個星期先見效，請俾時間觀察，並持續同醫療團隊合作，搵出最適合你嘅方案。

點樣診斷

- 詳細了解你嘅症狀，以及查閱**排尿日記**
- **尿液化驗**，排除感染或血尿
- 檢查排尿後膀胱係咪排空（快速膀胱超聲波掃描）
- 如情況不明確或其他治療無效，有時需要進一步檢查（尿動力學檢查或膀胱鏡）

點樣治療（循序漸進）

- 1 **生活調整及訓練** — 減少咖啡因／酒精、控制飲水量、處理便秘、保持健康體重，並進行**膀胱訓練**同**盆底運動（凱格爾運動）**。
- 2 **藥物** — 可以令膀胱肌肉平靜嘅口服藥。
- 3 **進階治療** — 膀胱注射 **Botox**，或**神經刺激療法**（PTNS 或骶神經調節）。每種都有獨立嘅病人資料單張。

日常照顧

- 記錄**排尿日記**幾日，找出誘發因素。
- 保持穩定飲水；唔好飲得太少，否則尿液過濃會更刺激膀胱。
- 採用**定時如廁**及醫療團隊教授嘅「抑制尿急」技巧（停下來、收緊盆底、深呼吸，先至去廁所）。

如果你有以下情況，請即刻聯絡醫療團隊：

- **小便有血**，或小便時有痛或灼熱感
- 發燒，或背部／腰側疼痛（可能係感染）
- **突然完全唔能夠小便**

要記住嘅三件事

1. OAB（尿急、尿頻、夜尿，有時漏尿）係常見且可治療嘅病，唔係正常老化。
2. 治療循序漸進：先係生活調整同膀胱訓練，再係藥物，之後先係 Botox 或神經刺激。
3. 排尿日記有助找出誘發因素；每個步驟俾幾個星期時間。如有血尿、疼痛、發燒或無法小便，請即刻聯絡醫療團隊。