

PDE5 抑制劑（ED & 前列腺藥物）

WARWIKI

病人須知 · 治療勃起功能障礙 — 以及前列腺引起嘅排尿症狀

PDE5 抑制劑係用嚟治療勃起功能障礙 (ED) 嘅藥物，其中一種（他達拉非）亦可改善前列腺增大引起嘅排尿症狀。常見嘅有西地那非 (Viagra)、他達拉非 (Cialis)、伐地那非、阿伐那非。呢啲藥係幫助身體喺有性慾刺激嘅時候產生勃起 — 唔係自動令你勃起。

點樣運作

呢啲藥會舒張陰莖嘅血管，令血液流入。最重要嘅係，佢哋只喺有性刺激嘅情況下先至有效 — 你仍然需要有性慾；藥物唔會自動令你勃起。他達拉非亦可放鬆前列腺同膀胱肌肉，所以低劑量每日服用可改善尿流。

會點樣

- 西地那非 / 伐地那非 / 阿伐那非約30–60 分鐘起效，維持數小時。
- 他達拉非效果較長（長達約 36 小時 — 俗稱「週末藥」），亦可選擇低劑量每日服用。
- 高脂肪飲食可能會延遲西地那非嘅吸收；他達拉非唔受食物影響。
- 可能需要嘗試幾次先至搵到適合嘅劑量同時間。

詞彙解釋

PDE5 抑制劑

呢類藥物（西地那非、他達拉非等）用於治療 ED。

勃起功能障礙 (ED)

難以勃起或維持足以進行性行為嘅勃起。

硝酸鹽

治療心臟病／心口痛嘅藥物，絕對唔可以同呢啲藥一齊服用。

按需服用 vs. 每日服用

性行為前服用，或者每日低劑量服用。

BPH

良性前列腺增生 (BPH)；他達拉非亦可治療其排尿症狀。

陰莖持續勃起症

勃起超過 4 小時 — 屬緊急醫療情況。

最重要嘅一條規則 絕對唔可以將呢啲藥同**硝酸鹽**（例如硝化甘油或治療心口痛嘅硝酸異山梨酯）或「poppers」（亞硝酸戊酯）一齊服用。兩者同時使用可能導致**血壓急劇下降，甚至危及生命**。請告知每位醫護人員你正在服用 PDE5 抑制劑。

點樣食

- 按照醫生指示服用 — 性行為前服用（按需）或每日服用，視乎你嘅處方。
- 按需服用西地那非時，建議**空腹或少食**以加快吸收。
- 除非醫生指示，否則 24 小時內唔好服用多過一次。

重要安全須知

- **唔可以服用硝酸鹽或 poppers** — 任何時候都唔得（見上文）。
- 服用**甲型腎上腺素阻滯劑**或其他降血壓藥時要小心（可能加重頭暈） — 醫療團隊會調整服藥時間或劑量。
- 如果你有**嚴重心臟病**，請先問醫生性行為同呢啲藥對你係唔係安全。
- 減少飲**酒精**，因為會加重頭暈。

常見副作用

- 頭痛、面部**潮紅**、鼻塞、消化不良
- 背痛或肌肉痠痛（他達拉非較常見）
- 視覺出現短暫**藍色色調**
（西地那非 / 伐地那非）

如果你有以下情況，請即刻聯絡醫療團隊：

- 勃起持續**超過 4 小時**（陰莖持續勃起症）
- **突然失去視力或聽力** — 即刻停藥並就醫
- **心口痛、暈倒或嚴重頭暈**

要記住嘅三件事

1. PDE5 抑制劑係喺**有性刺激時**幫你勃起（唔會自動起效）；他達拉非亦可改善前列腺排尿症狀。
2. **絕對唔可以同硝酸鹽或 poppers 一齊服用** — 血壓驟降可危及生命。
3. 勃起超過 4 小時，或突然失去視力 / 聽力，請即刻求醫。