

控制膀胱最有效嘅兩個方法唔需要食藥或做手術：盆底肌肉運動（凱格爾運動）可以強化承托膀胱同尿道嘅肌肉，減少漏尿；膀胱訓練可以幫膀胱學識等耐啲先去廁所。持續練習可以改善壓力性漏尿、尿急同尿頻 — 而且免費、安全。

點樣有幫助

- **盆底運動**強化膀胱同尿道下面嘅肌肉，咳嗽、搬重物或做運動時較少漏尿，亦可以控制尿急。
- **膀胱訓練**逐步延長去廁所嘅間距，令過度活躍嘅膀胱平靜下來，減少尿頻。

點樣搵啱嘅肌肉

盆底肌肉係你**忍住尿**或者忍住排氣時用嘅肌肉。收緊並向上提起呢啲肌肉，**唔好**收緊肚臍、臀部或大腿，**唔好憋氣**。（唔好係真係排尿時突然忍住 — 呢個只係用嚟幫你搵到肌肉位置。）如果唔確定係唔係啱，**盆底物理治療師**可以幫到你，有時會用生物反饋儀器輔助。

詞彙解釋

盆底

承托膀胱、腸道，以及（女性）子宮嘅一組肌肉。

凱格爾運動

收緊並向上提起盆底肌肉嘅運動。

膀胱訓練

逐步延長去廁所嘅時間間距。

抑制尿急

控制突然嘅尿急感，令自己可以平靜走去廁所而唔漏尿。

生物反饋

顯示你係咪用緊啱嘅肌肉嘅儀器。

盆底物理治療師

專門處理盆底問題嘅治療師。

幾耐先見效？ 要俾時間 — 大多數人定期練習約 **6–12 星期**後會見到改善，堅持落去效果會繼續提升。同其他運動一樣，停咗就會退步，所以目標係養成每日嘅習慣。

簡單每日練習

- 1 收緊盆底肌肉，保持 3–5 秒，然後完全放鬆同樣時間。
- 2 重複約 **10 次**，每日做 **3 組**。隨住肌肉增強可以延長持續時間。
- 3 加入幾下**快速有力嘅收緊**，喺咳嗽、打噴嚏或搬重物之前用（「技巧收縮」）。
- 4 每次收緊之間完全放鬆，同收緊一樣重要。

膀胱訓練

- 記錄簡短嘅**膀胱日記**，了解自己嘅如廁規律。
- 有尿急感時，**停低、收緊盆底、慢慢呼吸**，等尿急感消退 — 然後平靜咁行去廁所。
- 每次延長 15 分鐘，逐步延長去廁所嘅間距，目標係每 3–4 小時一次。

實用貼士

- 呢啲運動**喺任何地方都可以做** — 冇人知道你係咪做緊。
- 持之以恆比強度更重要；將運動同日常習慣掛鉤（例如用餐、等紅燈）。
- 如果你有**骨盆痛**或盆底肌肉過緊，目標可能係**放鬆**而非強化 — 請先問你嘅醫療團隊。

如果有以下情況，請問你嘅醫療團隊：

- 唔確定係咪用緊啱嘅肌肉
- 運動令**痛楚加重**或有壓迫感
- 練習幾個月後冇任何改善

要記住嘅三件事

1. 盆底運動同膀胱訓練係安全、免費、有實證嘅第一步，適合改善漏尿、尿急同尿頻。
2. 收緊啱嘅肌肉（唔好憋氣），每次之間完全放鬆，同時訓練膀胱等耐啲。
3. 堅持 6–12 星期，保持長期習慣。如果痛楚加重或搵唔到肌肉，可以諮詢盆底物理治療。