

盆腔器官脫垂係指支撐盆腔器官——膀胱、子宮或直腸——嘅組織鬆弛，令一個或多個器官向陰道方向下壓或突出，引起膨出感或壓迫感。呢個情況好常見，唔危險、唔係癌症，而且有好多選擇：由運動、支撐裝置到手術都有。

關於呢個病

脫垂係按下垂嘅部位命名：

- **前壁**（膀胱）— 膀胱膨出（cystocele）
- **後壁**（直腸）— 直腸膨出（rectocele）
- **頂端**（子宮，或子宮切除後嘅陰道頂端）

常見症狀：

- 喺陰道口可以見到或感覺到**膨出或腫塊**
- 盆腔有**壓迫感或沉重感**，通常到日尾或舉重物時加重
- 膀胱或腸道唔容易排清；有時要用手按住膨出部位先排得到（「splinting」）

成因

任何令盆底承受壓力或令其鬆弛嘅情況均可導致：**懷孕及分娩**、更年期及衰老、長期用力（便秘或咳嗽）、搬重物、曾接受盆腔手術、體重過重，以及家族遺傳。

詞彙解釋

脫垂

盆腔器官從正常位置下移。

膀胱膨出

膀胱向陰道前壁突出。

直腸膨出

直腸向陰道後壁突出。

陰道頂端

陰道嘅頂部，子宮切除後可能下垂。

子宮托

放入陰道嘅可移除支撐裝置，毋須手術即可托住器官。

Splinting

用手按住膨出部位協助排尿或排便。

盆底

支撐盆腔器官嘅肌肉群。

POP-Q

量度脫垂程度嘅標準化檢查。

我係咪一定要治療？ 只有令你困擾先需要治療。脫垂唔危險，如果症狀輕微，可以觀察就好。當影響到你嘅舒適度或日常生活，你可以揀不同嘅有效方法——冇唯一「正確」答案，而且隨時可以改變心意。

點樣診斷

- **盆腔檢查**，通常係站立或用力時進行，睇清楚哪面牆下垂及下垂程度
- 詢問膀胱及腸道症狀
- 如同時有漏尿，有時需要做**膀胱功能測試**

點樣治療（逐步）

- 1 **觀察等待**（如症狀唔困擾），同時預防：處理便秘、避免搬重物、控制體重。
- 2 **盆底運動／物理治療**，適合輕度脫垂。
- 3 **子宮托**——毋須手術嘅可移除支撐裝置，可消除膨出感。
- 4 **手術**——修復支撐結構、陰道關閉術（colpocleisis）或懸吊術。每種術式均有專屬病人須知。

日常照顧

- 保持大便鬆軟，**避免用力**；唔好搬超過醫療團隊建議重量嘅物件。
- 做盆底運動；處理慢性咳嗽及控制體重。
- 子宮托可以係長期方案，唔只係臨時措施。

如果你有以下情況，請即刻聯絡醫療團隊：

- 你**完全唔能夠排尿**或排便
- 膨出部位**痛、出血或潰爛**
- 發燒，或膨出部位推唔返入去

要記住嘅三件事

1. 脫垂係盆腔器官常見嘅下垂，唔危險，會引起膨出感或壓迫感。
2. 只有當症狀困擾你先需要治療——選擇由觀察等待、運動、子宮托到手術都有。
3. 避免用力及搬重物。如果唔能夠排尿或排便，或膨出部位痛楚或潰爛，請立即求診。