

Impeksiyon sa Ihi (UTI)

WARWIKI

Impormasyon para sa Pasyente · Ano ang UTI, paano ito ginagamot, at paano maiiwasan

Ang urinary tract infection (UTI) ay nangyayari kapag lumaki ang bakterya sa daanan ng ihi. Karamihan ay **impeksiyon sa pantog** (bladder infection), na nagdudulot ng hapdi kapag umihi, biglaang pangangailangan, at madalas na pag-ihing. Minsan naaabot ng impeksiyon ang **bato** (kidney), na mas malubha. Karamihan sa UTI ay gumagaling agad sa tamang antibiotics, at may mabubuting paraan ng pag-iwas.

Tungkol sa Kondisyong Ito

Ang impeksiyon sa pantog (**cystitis**) ay kadalasang nagdudulot ng:

- **Hapdi o kirot** kapag umihi
- **Biglaang pangangailangan at madalas na pag-ihing** — kaunti-kaunting ihi bawat beses
- Malabo, maitim, o mabahong ihi; panakit sa ibabang bahagi ng tiyan

Ang **impeksiyon sa bato** (pyelonephritis) ay mas malubha at nagdudulot pa ng **lagnat, pangiginig, sakit sa likod o tagiliran, at pagsusuka** — kailangan ito ng agarang lunas.

Mga Sanhi

Ang bakterya (karaniwang mula sa bituka) ay pumapasok sa pamamagitan ng urethra at lumalaki sa pantog. Ang mga bagay na nagpapataas ng panganib ay kinabibilangan ng **pakikipagtalik, menopause** (mababang estrogen), hindi ganap na pag-ihing, catheter, bato sa ihi, at diabetes.

MGA TERMINO

UTI

Impeksiyon sa anumang bahagi ng daanan ng ihi.

Cystitis

Impeksiyon sa pantog — ang pinakakaraniwang UTI.

Pyelonephritis

Impeksiyon sa bato — mas malubha, madalas may lagnat.

Urine culture

Pagsusuri na pinapalaki ang bakterya para mahanap ang tamang antibiotics.

Recurrent UTI

Paulit-ulit na impeksiyon (madalas 2–3 o higit pa sa isang taon).

Vaginal estrogen

Mababang dosis na cream o tablet na nagpapababa ng panganib ng UTI pagkatapos ng menopause.

Asymptomatic bacteriuria

Bakterya sa ihi nang walang sintomas — karaniwang hindi na ginagamot.

KAILANGAN KO BA LAGING NG ANTIBIOTICS? Kung mayroon kang sintomas, ginagamot ang UTI ng antibiotics. Ngunit kung may nakitang bakterya sa ihi at **walang nararamdaman**, karaniwang **hindi** na ito ginagamot — ang antibiotics sa ganitong sitwasyon ay mas makakasama kaysa makakatulong. Ang mahahalagang pagbubukod ay ang pagbubuntis at bago ang ilang pamamaraang may kinalaman sa ihi.

Paano Ito Nasusuri & Ginagamot

- Kine-kumpirma ng inyong care team ang UTI gamit ang inyong **mga sintomas** at isang **pagsusuri/culture ng ihi**.
- Ang impeksiyon sa pantog ay ginagamot ng **maikling kurso ng antibiotics**.
- Ang **impeksiyon sa bato** ay maaaring mangailangan ng mas malakas o mas matagal na antibiotics, at minsan ng pag-ospital.
- Tapusin ang buong kurso, kahit gumaling na ang pakiramdam.

Pag-iwas sa Paulit-ulit na UTI

- **Uminom ng maraming tubig** at huwag pigilan ang pag-ihing matagal.
- Umihi pagkatapos ng pakikipagtalik; punasan mula harap patungo sa likod.
- Pagkatapos ng menopause, ang **vaginal estrogen** ay makakatulong na mapababa ang panganib.
- Magtanong tungkol sa mga pagpipiliang hindi antibiotics, at tungkol sa preventive antibiotics kung madalas ang impeksiyon.

Mabuting Malaman

- Ang cranberry products at D-mannose ay nakakatulong sa ilan; halo-halo ang ebidensya — makatuwirang subukan.
- Ang paulit-ulit na UTI ay minsan nagbubunga ng pagsusuri para sa sanhi (hindi ganap na pag-ihing bato sa ihi).
- Kung mayroon kang catheter, inaasahan ang ilang bakterya — ang paggamot ay batay sa mga sintomas, hindi sa pagsusuri lamang.

Tawagan ang inyong care team kung kayo ay may:

- **Lagnat, panginig, o sakit sa likod/tagiliran** (posibleng impeksiyon sa bato)
- Pagduduwal o pagsusuka, o pakiramdam na napakasama
- Kitang **dugo sa ihi**, o hindi gumagaling ang mga sintomas sa antibiotics
- Pagbubuntis at may anumang sintomas ng UTI

TATLONG BAGAY NA DAPAT TANDAAN

1. Karamihan sa UTI ay impeksiyon sa pantog (hapdi, biglaang pangangailangan) at gumagaling sa maikling kurso ng antibiotics; ang impeksiyon sa bato (lagnat, sakit sa tagiliran) ay mas malubha.
2. Ang bakterya sa ihi **nang walang sintomas** ay karaniwang hindi dapat gamutin — maliban sa pagbubuntis o bago ang ilang pamamaraan.
3. Iwasan ang paulit-ulit sa pamamagitan ng paginom ng maraming tubig, pag-ihing pagkatapos ng pakikipagtalik, at (pagkatapos ng menopause) vaginal estrogen. Humanap ng lunas para sa lagnat, sakit sa tagiliran, o pagsusuka.