

Urodynamics

Impormasyon para sa Pasyente · Pagsusuri kung paano nagpupuno at kumukuha ng ihi ang pantog **WARWIKI**

Ang urodynamics ay isang grupo ng mga pagsusuri na sumusukat kung gaano kahusay na nag-iimbak at naglalabas ng ihi (urine) ang inyong pantog (bladder). Ginagamit ang manipis at malambot na mga tubo (catheter) upang sukatin ang presyon habang dahan-dahan na pinupunuan at saka pinaplabas ang pantog. Layunin nito na kopyahin ang inyong mga sintomas dito sa opisina upang malaman ng inyong care team ang tamang sanhi at makapagplano ng tamang paggamot.

Tungkol sa Pagsusuring Ito

Ang urodynamics ay hindi isang pagsusuri lamang kundi ilang pagsusuri na ginagawa nang sabay. Depende sa inyong pangangailangan, maaaring kabilang ang:

- Ang **flow test** — umihi kayo sa espesyal na inidoro na sumusukat ng inyong stream ng ihi, at tinitingnan ng team kung magkano ang natitira.
- Ang **filling study** — dahan-dahan na pinupunuan ang pantog habang sinusukat ang presyon at iniuulat ninyo ang inyong nararamdaman.
- Ang **pressure-flow study** — sinusukat ang presyon habang kayo ay umihi.
- Minsan, **kinukuha rin ang X-ray** nang sabay (video urodynamics).

Dalawang manipis na catheter ang ginagamit: isa sa pantog (sa pamamagitan ng urethra) at isa pang napakaliit sa puwit (o puki/vagina) upang sukatin ang presyon ng tiyan, para malaman ng team ang pagkakaiba ng presyon ng pantog sa pag-umod.

Ligtas Ba Ito?

Oo. Ang urodynamics ay isang mababang-panganib na pagsusuri. Ang pangunahing panganib ay mula sa mga catheter — maikling pakiramdam na pasusunog at maliit na pagkakataon ng impeksiyon sa ihi (UTI). Maaaring bigyan kayo ng antibiotic. Walang operasyon at walang pahinga na kailangan pagkatapos.

MGA TERMINO

Urodynamics

Isang grupo ng mga pagsusuri na sumusukat kung paano nag-iimbak at naglalabas ng ihi ang pantog.

Pantog (Bladder)

Ang malambot na supot na nag-iimbak ng ihi hanggang sa umihi kayo.

Catheter

Manipis at malambot na tubo na ginagamit upang punuin ang pantog at sukatin ang presyon.

Filling study

Sumusukat ng presyon at nararamdaman habang dahan-dahan na napupuno ang pantog.

Pressure-flow study

Sumusukat ng presyon habang umihi kayo, upang makita kung paano kumukuha ang pantog.

Flow test

Sumusukat ng bilis at pattern ng inyong stream ng ihi.

Video urodynamics

Parehong pagsusuri na may karagdagang X-ray para sa mas detalyadong impormasyon.

Post-void residual

Ang dami ng ihi na natitira sa pantog pagkatapos umihi.

MASAKIT BA? Karamihan sa mga tao ay nakakaramdam ng presyon at kaunting pagkahiya mula sa mga catheter kaysa sa tunay na sakit. Hihilingin sa inyong umusal, magpalit ng posisyon, at umihi habang isinasagawa ang pagsusuri — pinapanatili kayong tukuban ng team at nagtatrabaho ayon sa inyong bilis. Karaniwang tumatagal ng 30–60 minuto, at maaari kayong umuwi agad pagkatapos.

Paano Maghanda (Bago ang Pagsusuri)

- Maaaring hilingin sa inyong dumating na may **pantog na medyo puno** — sundin ang mga instruksyon na ibibigay sa inyo.
- Inumin ang inyong **karaniwang gamot**, ngunit tanungin kung kailangang **ihinto muna ang anumang bladder medicine**, dahil maaari itong makaimpluwensya sa resulta.
- Hindi kailangan ng sedation, kaya kadalasan ay **makakauwi kayo nang mag-isa**.

Sabihin sa inyong team **nang maaga** kung kayo ay:

- May palatandaan ng **impeksiyon sa ihi** (UTI) (pakiramdam na pasusunog, lagnat, o maulap at mabahong ihi) — ang aktibong impeksiyon ay maaaring dahilan ng muling pag-iskedyul ng pagsusuri
- Umiinom ng blood thinner, o may anumang allergy (kasama ang latex)

Maaaring hilingin sa inyong magbigay ng **sample ng ihi** upang suriin kung may impeksiyon bago ang pagsusuri.

Ano ang Nangyayari Habang Isinasagawa ang Pagsusuri

- 1 Umihi kayo sa espesyal na inidoro na sumusukat ng inyong stream, at tinitingnan ng team kung magkano ang natitira.
- 2 Maingat na inilalagay ang mga manipis na catheter — isa sa pantog at isang maliit sa puwit o puki (vagina).
- 3 Dahan-dahan na pinupunuan ang pantog habang iniuulat ninyo kung kailan kayo unang nakaramdam na puno at kung kailan kayo nakaramdam ng matinding pag-urge; maaaring hilingin sa inyong umusal o magpalit ng posisyon.
- 4 Umihi kayo habang nire-rekord ang mga presyon, at pagkatapos ay tinatanggal ang mga catheter.

Pagkatapos ng Pagsusuri

- Maaari kayong bumalik sa **normal na gawain agad**.
- Maaaring maramdaman ninyo ang **magaan na pasusunog kapag umihi** sa loob ng isang araw. Ang pag-inom ng maraming tubig ay nakakatulong at nagpapagaan nito.
- Maaaring mapansin ninyo ang **kaunting kulay-rosas** sa inyong ihi sa maikling panahon. Ito ay karaniwan at kadalasang nawawala sa loob ng isang araw.

Tawagan ang inyong care team kung kayo ay may:

- Lagnat o panginginig
- Hirap umihi, o hindi kayo makaiihi
- Matinding pagdurugo, o may namuong dugo sa ihi
- Sakit na lumalala sa halip na gumagaling

TATLONG BAGAY NA DAPAT TANDAAN

1. Sinusukat ng urodynamics kung paano nagpupuno at kumukuha ng ihi ang inyong pantog upang malaman ng inyong team ang sanhi ng pagtagas, pag-urge, o hirap sa pag-ihing — at makapagplano ng tamang paggamot.
2. Kaunti lang ang kailangang gawin bago. Tanungin kung ihihinto ang anumang bladder medicine, dumating na may medyang puno ang pantog kung hihilingin, at sabihin sa inyong team kung may palatandaan ng impeksiyon.
3. Asahan ang presyon kaysa sakit, at umuwi agad pagkatapos. Ang magaan na pasusunog o kaunting kulay-rosas sa ihi sa loob ng isang araw ay normal — uminom ng maraming tubig.