

Vaginal Estrogen Therapy

Impormasyon para sa Pasyente · Mababang dosis, lokal na lunas para sa pagkatuyo ng puki at **WARWIKI** sintomas ng pantog

Ang vaginal estrogen ay isang **mababang dosis ng estrogen na inilalagay nang direkta sa puki (vagina)** — bilang cream, tablet, o ring — para gamutin ang pagkatuyo, pangangati, masakit na pakikipagtalik, at mga sintomas ng pantog na dulot ng pagbaba ng estrogen pagkatapos ng menopause. Dahil lokal ang epekto nito, kakaunti ang naabot ng dugo, kaya ligtas para sa karamihan ng tao.

Ano ang Ginagamot Nito

Pagkatapos ng menopause, binabawasan ng mababang estrogen ang kapal at dumi ng mga tissue ng puki at urethra — tinatawag itong **genitourinary syndrome of menopause (GSM)**. Nire-restore ng vaginal estrogen ang lining na ito at maaari nitong:

- Ginhawa ang **pagkatuyo ng puki, pangangalit, at pangangati, at masakit na pakikipagtalik**
- Bawasan ang **biglaang pangangailangang umihi (urgency) at madalas na pag-ihing (frequency)**
- Bawasan ang panganib ng **paulit-ulit na impeksiyon sa ihi (UTI)**

Ligtas Ba Ito?

Para sa karamihan, oo. Ang vaginal estrogen ay **napakababang dosis at lokal lamang** — ibang-iba sa mga estrogen pill o patch para sa hot flashes — at kaunti lamang ang nasisipsip ng katawan. Kung may kasaysayan ka ng breast cancer o iba pang hormone-sensitive na cancer, maaari pa rin itong gamitin sa maraming kaso; talakayin ito sa iyong care team bilang pinagsamang desisyon.

MGA TERMINO

GSM

Genitourinary syndrome of menopause — pagkatuyo, panipis ng tissue, at mga sintomas ng pantog dahil sa mababang estrogen.

Vaginal estrogen

Mababang dosis ng estrogen na inilalagay sa puki (vagina) bilang cream, tablet, o ring.

Lokal vs. systemic

Lokal ay kumikilos sa pinaglagyan; systemic (pill/patch) ay nakakaapekto sa buong katawan.

Maintenance dose

Ang mas mababang, tuluy-tuloy na dosis pagkatapos ng unang ilang linggo.

Paulit-ulit na UTI

Madalas na impeksiyon sa pantog na maaring mapigilan ng vaginal estrogen.

Moisturizer / lubricant

Mga produktong walang hormona na maaaring gamitin kasabay nito.

KAILAN MARARAMDAMAN ANG PAGBABAGO? Marami ang nakakaramdam ng ginhawa sa loob ng ilang linggo, at ang buong benepisyo ay makikita pagkatapos ng humigit-kumulang 8–12 linggo. Gumagana ito habang ginagamit mo ito, kaya ito ay pangmatagalang pag-aalaga — ang mga sintomas ay may tendensiyang bumalik kapag tumigil ka.

Paano Gamitin

- 1 **Simula:** karamihan sa mga anyo ay ginagamit **tuwing gabi sa loob ng mga 2 linggo** para ma-restore ang tissue.
- 2 **Maintenance:** pagkatapos, babawasan sa **dalawang beses sa isang linggo** (ang ring ay pinapalitan tuwing 3 buwan).
- 3 Gamitin ito bago matulog (**bedtime**) para manatili ito sa lugar; hugasan ang mga kamay bago at pagkatapos.
- 4 Ituloy nang pangmatagalan — ligtas itong gamitin at ang benepisyo ay nakasalalay sa regular na paggamit.

Mga Anyo na Available

- **Cream** — may kakayahang baguhin ang dosis gamit ang applicator
- **Tablet / insert** — malinis, nasukat na ang dosis
- **Ring** — inilalagay tuwing 3 buwan, hindi kailangang alagaan nang madalas

Mahalagang Malaman

- Maaari kang magdagdag ng nonhormonal na **moisturizer o lubricant** para sa karagdagang kaginhawahan.
- Ang kaunting discharge o spotting sa simula ay normal; karaniwang nawawala ito.
- Angkop ito kasabay ng pelvic-floor therapy at iba pang paggamot sa pantog.

Tawagan ang inyong care team kung kayo ay may:

- Anumang **pagdurugo sa puki pagkatapos ng menopause** — palaging ipasuri ito
- Bagong bukol sa suso o hindi karaniwang sintomas
- Pangangati na lumala sa halip na gumaling

TATLONG BAGAY NA DAPAT TANDAAN

1. Ang vaginal estrogen ay mababang dosis, lokal na lunas para sa pagkatuyo ng puki na may kaugnayan sa menopause, masakit na pakikipagtalik, at mga sintomas ng pantog — at kaunti lamang ang nasisipsip ng katawan.
2. Gamitin tuwing gabi sa loob ng mga 2 linggo, pagkatapos dalawang beses sa isang linggo nang pangmatagalan (o ring tuwing 3 buwan); nakasalalay ang benepisyo sa tuluy-tuloy na paggamit.
3. Ligtas para sa karamihan — talakayin ang anumang kasaysayan ng cancer sa inyong care team. Laging iulat ang pagdurugo pagkatapos ng menopause.