

Vaginal Hysterectomy (para sa Prolapse)

Impormasyon para sa Pasyente · Pag-alis ng matris (uterus) sa pamamagitan ng puki, na may **WARWIKI** pagpapangat ng tuktok ng puki

Kapag ang matris (uterus) ay bumaba bilang bahagi ng pelvic organ prolapse, ang isang pagpipilian ay ang **vaginal hysterectomy** — ang pag-alis ng matris sa pamamagitan ng puki, **nang walang hiwa sa tiyan**. Ito ay halos palaging sinasamahan ng **suspension** ng tuktok ng puki (at madalas na iba pang pag-aayos) upang maayos na masuportahan ang lugar pagkatapos.

Tungkol sa Operasyong Ito

Ang matris ay inilalagay at inaabot palabas sa puki. Pagkatapos, ang **tuktok ng puki ay isinisampa** sa inyong matatag na pelvic ligaments upang hindi na ito mahulog muli. Maaaring idagdag ang pag-aayos ng harap o likod na dingding batay sa inyong pagsusuri. Ang vaginal route ay karaniwang nangangahulugang **mas kaunting sakit at mas mabilis na paggaling** kaysa sa operasyon sa pamamagitan ng tiyan.

Mga Dapat Malaman

- Ang pag-alis ng matris ay nagwawakas sa regla at sa kakayahang magdala ng pagbubuntis.
- Kung ang prolapse ay pangunahing kinabibilangan ng matris at nais ninyong **panatilihin ang inyong matris**, ang uterus-sparing suspension (hysteropexy) ay maaaring isang pagpipilian — itanong sa inyong siruhano.
- Maaaring idagdag ang hiwalay na pamamaraan para sa **pagtagas ng ihi** kung kinakailangan.

MGA TERMINO

Hysterectomy

Operasyon para alisin ang matris (uterus).

Vaginal route

Ginagawa sa pamamagitan ng puki, walang hiwa sa tiyan.

Vault suspension

Muling pagsuporta ng tuktok ng puki upang manatiling nakaangat.

Hysteropexy

Alternatibong nagpapanatili ng matris sa pamamagitan ng suspension nang hindi ito inaaalis.

Prolapse

Pagbaba ng mga organ sa pelvis na nagdudulot ng bukol o presyon.

Vaginal packing

Gauze na inilalagay nang maikli pagkatapos ng operasyon para tulungan ang paggaling.

MASAKIT BA? Ginagawa ito sa ilalim ng anesthesia, kaya walang nararamdamang sakit habang isinasagawa. Dahil walang hiwa sa tiyan, ang paggaling ay karaniwang mas madali kaysa sa ibang uri ng hysterectomy — asahan ang banayad hanggang katamtamang pananakit, at karamihan sa mga pasyente ay nakakauwi sa araw na iyon o pagkatapos ng isang gabi.

Paano Maghanda

- Sundin ang inyong mga **tagubilin sa anesthesia** (pag-aayuno, pigilan ang blood thinners ayon sa sinabi).
- Pre-op na pagsusuri; talakayin kung idadagdag ang iba pang pag-aayos o anti-leakage na pamamaraan.
- Huwag manigarilyo; mag-ayos ng sasakyan at tulong sa bahay.

Ano ang Nangyayari

- 1 Kayo ay nasa ilalim ng anesthesia; ibibigay ang antibiotics.
- 2 Ang matris ay inilalagay at inaabot palabas **sa pamamagitan ng puki**.
- 3 Ang tuktok ng puki ay **isinisampa** sa inyong mga ligaments; ang mga karagdagang pag-aayos ay isasagawa ayon sa plano.
- 4 Ang isang catheter at minsan ay vaginal pack ay inilalagay nang maikli.

Pagkatapos ng Operasyon

- Ang banayad na pagdurugo o discharge sa loob ng ilang linggo ay normal habang gumagaling ang tuktok ng puki.
- **Iwasan ang mabigat na pagbubuhat, pag-uukol ng lakas, at pakikipagtulungan sa loob ng humigit-kumulang 6 na linggo.**
- Panatilihin malambot ang dumi upang maiwasan ang pag-uukol ng lakas; magpahinga, pagkatapos ay unti-unting dagdagan ang aktibidad.

Tawagan ang inyong care team kung kayo ay may:

- Lagnat o pangiginig, o mabigat na pagdurugo
- Hindi kayo makapag-ihi, o lumalalang sakit sa pelvis o tiyan
- Masangsang na discharge, o may lumalabas sa puki

TATLONG BAGAY NA DAPAT TANDAAN

1. Ang vaginal hysterectomy ay nag-aalis ng matris sa pamamagitan ng puki (walang hiwa sa tiyan) at may kasamang suspension ng tuktok ng puki.
2. Tinawapos nito ang regla at pagbubuntis; kung nais ninyong panatilihin ang inyong matris, itanong ang tungkol sa uterus-sparing suspension.
3. Iwasan ang mabigat na pagbubuhat at pakikipagtulungan ng ~6 na linggo; normal ang banayad na pagdurugo. Tumawag para sa lagnat, mabigat na pagdurugo, o hirap sa pag-ihi.