

Vaginal Suspension Surgery

Impormasyon para sa Pasyente · Pag-angat ng tuktok ng puki gamit ang sariling tela — walang mesh **WARWIKI**

Inaayos ng vaginal suspension surgery ang pagbaba ng organ (prolapse) ng **tuktok ng puki o matris** sa pamamagitan ng muling pagkakabit nito sa matibay na ligament ng pelvis — gamit ang **sarili ninyong tela**, walang mesh. Ginagawa ito sa loob ng puki, walang hiwa sa tiyan, at isang matibay na paraan ng pag-aayos na walang mesh.

Tungkol sa Prosedurang Ito

Ang tuktok ng puki ay tinatahi sa matibay na ligament sa loob ng pelvis upang itayo ito. Dalawang karaniwang uri:

- **Uterosacral ligament suspension (USLS)** — nakakabit sa uterosacral ligament sa kailaliman ng pelvis
- **Sacrospinous ligament fixation (SSLF)** — nakakabit sa sacrospinous ligament sa gilid

Parehong gumagamit ng **sariling tela** (permanenteng tahi), walang mesh. Madalas na kasabay ng pagsasaayos ng harap o likod ng puki, at kapag inalis na ang matris, sabay na ginagawa.

Paghahambing

Kumpara sa **sacrocolpopexy** (na nag-aangat ng puki gamit ang mesh sa tiyan), ang vaginal suspension ay walang mesh at walang hiwa sa tiyan; ang sacrocolpopexy ay maaaring mas matibay nang kaunti. Tutulungan kayo ng inyong siruhano na timbangin ang mga pagpipilian.

MGA TERMINO

Apex / vault

Ang tuktok ng vaginal vault (puki), na maaaring bumaba kapag may prolapse.

Suspension

Muling pagkakabit ng tuktok ng puki sa matibay na ligament.

USLS

Uterosacral ligament suspension.

SSLF

Sacrospinous ligament fixation.

Native tissue

Sariling tela — walang mesh ang repair na ito.

Vault prolapse

Pagbaba ng tuktok ng puki, madalas pagkatapos ng hysterectomy.

MASAKIT BA? Ginagawa ito sa ilalim ng anesthesia kaya wala kayong mararamdaman habang ginagawa ito, at walang hiwa sa tiyan. Sa SSLF, ang ilan ay nakakaramdam ng **sakit sa puwit o itaas ng hita** sa ilang araw hanggang linggo habang gumagaling — karaniwang nawawala ito nang kusa.

Paano Maghanda

- Sundin ang mga tagubilin para sa **anesthesia** (pag-aayuno, pigilan ang blood thinners ayon sa utos).
- Kailangan ng pre-op evaluation; maaaring isama ang ibang repairs o anti-leakage procedure.
- Huwag manigarilyo; mag-ayos ng sasakyan at tulong sa bahay.

Ano ang Nangyayari

- 1 Nasa ilalim kayo ng anesthesia; ibinibigay ang antibiotics.
- 2 Sa pamamagitan ng puki, tinatahi ang tuktok ng puki sa matibay na ligament ng pelvis.
- 3 Ginagawa ang mga karagdagang wall repairs ayon sa plano.
- 4 Inilalagay ang catheter at kung minsan ay vaginal pack nang ilang sandali.

Pagkatapos ng Operasyon

- Uwi sa araw ding iyon o pagkatapos ng isang gabi; normal ang kaunting pagdurugo o discharge.
- **Iwasan ang mabigat na pag-angat, pag-aatikabo, at pakikipagtalo sa loob ng halos 6 na linggo.**
- Ang sakit sa puwit (sa SSLF) ay karaniwang nawawala sa ilang linggo; panatiliing malambot ang dumi.

Tawagan ang inyong care team kung kayo ay may:

- Lagnat o panginginig, o matinding pagdurugo
- **Hindi kayo makaihi**, o lumalang sakit sa pelvis
- **Matindi o nananakit na sakit sa puwit/hita**, o bagong pamamanhid

TATLONG BAGAY NA DAPAT TANDAAN

1. Ang vaginal suspension ay nag-aangat ng tuktok ng puki gamit ang sariling ligament — matibay, walang mesh, at ginagawa sa pamamagitan ng puki.
2. Ang karaniwang uri ay USLS at SSLF; ang sacrocolpopexy ang alternatibong may mesh/tiyan kung gusto ninyong ikumpara.
3. Iwasan ang mabigat na pag-angat at pakikipagtalik ~6 linggo. Maaaring maramdaman ang banayad na sakit sa puwit sa SSLF; tumawag para sa lagnat, matinding pagdurugo, o matinding sakit sa hita/puwit.