

Voiding Cystourethrogram (VCUG)

Impormasyon para sa Pasyente · Ano ang aasahan bago ang inyong X-ray ng pantog at urethra

WARWIKI

Ang voiding cystourethrogram — o “VCUG” — ay isang X-ray na kumukuha ng larawan ng inyong pantog (bladder) at urethra habang pinupuno ng espesyal na contrast dye ang pantog at habang umihi kayo. Ipinapakita nito kung paano napupuno at naubos ang pantog, at tinutulungan ang inyong care team na makita ang mga problema tulad ng pag-agos ng ihi pabalik sa bato (reflux), pagsikip, o tagas.

Tungkol sa Pagsusuring Ito

Ang pantog ay nag-iimbak ng ihi, at ang urethra ang tubo na nagdadala nito palabas ng katawan. Pinupuno ng VCUG ang pantog ng contrast dye na nagpapakita ng puti sa X-ray, pagkatapos kinukuha ang mga larawan habang umihi kayo. Dahil nakikita ang pantog at urethra *habang gumagana*, makikita ang mga bagay na hindi makikita sa simpleng litrato.

Maaaring i-order ng inyong care team ang VCUG upang:

- Makita kung paano napupuno at naubos ang pantog
- Tingnan kung bumabalik ang ihi papalayo sa bato (reflux)
- Suriin ang bladder neck at urethra habang umihi
- Hanapin ang pagsikip, tagas, o maliit na bulsa (diverticulum)
- Suriin ang paggaling pagkatapos ng operasyon sa pantog, prostate, o urethra

Tinitingnan ng pagsusuring ito ang inyong lower urinary tract — ang pantog at urethra. Ito ay isang larawan upang gabayan ang inyong pag-aalaga, hindi isang paggamot.

Ligtas Ba Ito?

Oo. Ang VCUG ay isang karaniwang, mababang-panganib na pagsusuri. Maliit ang dami ng X-ray na ginagamit, at ang contrast dye ay lumalabas sa katawan sa pamamagitan ng ihi. Ang pinakakaraniwang isyu ay banayad na impeksiyon sa ihi (UTI) mula sa catheter — kaya naman ginagamit ang malinis na pamamaraan at minsan ay ibinibigay ang antibiotic. Ang maikling kakulangan sa ginhawa, banayad na pagsusunog, o kaunting dugo habang umihi pagkatapos ay karaniwang mahinahon at mabilis na lumilipas.

MGA TERMINO

Bladder (Pantog)

Ang organ na nag-iimbak ng ihi hanggang handa na kayong umihi.

Urethra

Ang tubo na nagdadala ng ihi mula sa pantog palabas ng katawan.

Catheter

Manipis na malambot na tubo na nagpapalabas o nagpupuno ng pantog. Maaaring maipasok ang contrast dye sa pamamagitan ng catheter na mayroon na kayo, o sa bagong inilagay para sa pagsusuri.

Suprapubic tube (SPT)

Isang catheter na nagpapalabas ng ihi sa pamamagitan ng maliit na butas sa ibabang tiyan, hindi sa urethra. Kung mayroon kayong SPT, maaari itong gamitin upang punan ang pantog para sa pagsusuri.

Contrast dye

Isang likido na nagpapakita ng puti sa X-ray para makita ang pantog at urethra.

Voiding (Pag-ih)

Pag-ih — pag-ubos ng pantog. Ang mahahalagang larawan ay kinukuha habang umihi kayo.

Reflux

Kapag ang ihi ay bumabalik mula sa pantog patungo sa bato. Makikita ito sa VCUG.

Fluoroscopy

Uri ng X-ray na nagpapakita ng mga gumagalaw na larawan habang dumadaraos ang contrast dye.

Post-void image

Larawan na kinuha pagkatapos umihi, upang makita kung gaano kahusay na naubos ang pantog.

MASAKIT BA? Kung mayroon na kayong catheter o suprapubic tube, dito ilalagay ang contrast dye — walang bagong tubo. Kung wala, maikling inilalagay muna ang manipis na catheter. Hihilingin sa inyo na umihi habang isinasagawa, na tumatagal ng mga 30 minuto.

Paano Maghanda (Bago ang Pagsusuri)

Kaunti lang ang kailangang gawin. Sa karamihan ng kaso:

- Kung mayroon na kayong **urinary catheter o suprapubic tube**, iwanang nakalagay — kadalasan ito ang gagamitin, kaya hindi na kailangan ng bagong tubo.
- Maaari kayong **kumain at uminom nang normal** at inumin ang inyong **karaniwang gamot**, maliban kung sinabihan kayo ng inyong team.
- Kadalasan ay maaari kayong **magmaneho pauwi**, dahil hindi na kailangan ng sedation.

Sabihin sa inyong team nang maaga kung kayo ay:

- Nagkaroon na ng reaksiyon sa contrast dye o iodine
- Umiinom ng blood thinner
- **Maaaring buntis** — kadalasan iniwasan ang X-ray sa panahon ng pagbubuntis
- May sintomas ng UTI (pagsusunog, lagnat, o maulap/mabahong ihi) — maaaring i-reschedule ang pagsusuri

Maaaring hilingin sa inyo na magbigay ng **sample ng ihi** upang suriin ang impeksiyon, at maaari ring bigyan kayo ng **antibiotic** upang bawasan ang maliit na panganib ng impeksiyon.

Ano ang Nangyayari Habang Isinasagawa ang Pagsusuri

- 1 Mahihiga kayo sa X-ray table.
- 2 **Ilalagay ang contrast dye sa pantog.** Kung mayroon na kayong **suprapubic tube o urethral catheter**, doon ito ilalagay — **walang bagong tubo**. Kung wala, ipapasok ang manipis na catheter sa urethra.
- 3 Dahan-dahang pinupuno ang pantog ng contrast dye — mararamdaman ninyo ang pagkapuno. Kinukuha ang mga larawan habang napupuno.
- 4 Kapag puno na ang pantog, hihilingin sa inyo na **umihi habang kumukuha ng X-ray** — ito ang pinakamahalagang bahagi. Kadalasan aalisin muna ang catheter; ang suprapubic tube ay maaaring pansamantalang isara.
- 5 Maaaring kumuha pa ng larawan pagkatapos maubos, para makita kung gaano kahusay naubos ang pantog.

Pagkatapos ng Pagsusuri

- Kadalasan ay maaari kayong umuwi at bumalik sa **normal na aktibidad kaagad**.
- Maaari kayong makaranas ng **bahagyang pagsusunog** habang umihi, o kaunting **dugo o pinkish na kulay**, sa loob ng isang araw — ang pag-inom ng dagdag na tubig ay nakakatulong.
- Kung mayroon kayong **catheter o suprapubic tube**, sasabihin ng inyong team kung paano ito alagaan. Ang contrast dye ay lumalabas sa ihi sa loob ng ilang oras.

Tawagan ang inyong care team kung kayo ay may:

- Lagnat o panginginig
- Hirap na umihi, o hindi makapagihi
- Malakas na pagdurugo, o pagdurugo na hindi humihinto
- Sakit na lumala sa halip na gumaling

TATLONG BAGAY NA DAPAT TANDAAN

1. Ang VCUG ay ligtas na X-ray na pinupuno ang pantog ng dye at kinukunan habang umihi kayo — ipinapakita ang paggana ng pantog at urethra at nakikita ang reflux.
2. Kaunti lang ang paghahanda: kumain at inumin ang karaniwang gamot — ngunit sabihin ang anumang allergy sa dye, blood thinners, posibilidad ng pagbubuntis, o sintomas ng UTI.
3. Ang dye ay ilalagay sa catheter o suprapubic tube na mayroon na kayo, o manipis na tubo para sa pagsusuri; pagkatapos umihi kayo habang kinukunan. Normal ang banayad na pagsusunog o kaunting dugo sa loob ng isang araw — uminom ng dagdag na tubig.