

Peyronie's disease में लिंग के अंदर एक निशान (plaque) बन जाता है जो स्तंभन (erection) के दौरान लिंग को मोड़ देता है और कभी-कभी यौन संबंध मुश्किल कर देता है। इस सर्जरी में लिंग के छोटे, तंग हिस्से पर निशान को काटा जाता है और गैप को ग्राफ्ट (graft) से भरा जाता है। यह पर्चा बताता है कि यह कैसे काम करती है, तैयारी कैसे करें, और क्या उम्मीद करें।

इस प्रक्रिया के बारे में

निशान का plaque लिंग के एक तरफ खिंचाव पैदा करता है, जिससे erection के दौरान मोड़ आता है। यह ऑपरेशन **छोटे (अंदरूनी) हिस्से** पर निशान काटकर मोड़ दूर करता है; इससे बनी जगह को **ग्राफ्ट** — एक पतले पैच (जैसे collagen patch, donor/animal tissue, या आपके अपने शरीर का ऊतक) से भरा जाता है। यह लंबे हिस्से को छोटा करने की बजाय छोटे हिस्से को लंबा करता है, इसलिए **लिंग की लंबाई बनी रहती है**।

यह तब उपयोग होती है जब:

- आपका मोड़ **गंभीर या जटिल** है (जैसे घंटाघर या कब्जे जैसा आकार)
- **लंबाई बनाए रखना** जरूरी है (plication से बहुत छोटा हो जाता)
- आपके **erections मजबूत** हैं जो इस ऑपरेशन के लिए जरूरी हैं

क्या जानना जरूरी है

फायदा यह है कि **लंबाई बनी रहती है** (कभी-कभी थोड़ी बढ़ती भी है)। इसके बदले में plication से **स्तंभन दोष (ED) का खतरा अधिक** होता है — क्योंकि निशान पर काम करने से लिंग में खून रोकने की क्षमता प्रभावित हो सकती है — इसलिए यह केवल तभी दी जाती है जब erections मजबूत हों। लिंग के सिरे का **सुन्न होना** शुरुआत में आम है (सर्जरी में नसें सावधानी से हटाई जाती हैं) और 6-12 महीनों में सामान्यतः ठीक हो जाता है। अधिकतर पुरुषों को यौन संबंध के लिए सीधा erection मिलता है।

शब्दों को समझें

Peyronie's disease

लिंग में निशान जो erection के दौरान मोड़ पैदा करता है।

Plaque

निशान का वह पैच जो मोड़ का कारण है।

Graft

निशान हटाने के बाद गैप भरने वाला पतला पैच — collagen patch, donor/animal tissue, या आपके अपने शरीर का ऊतक।

Artificial erection

ऑपरेशन कक्ष में injection से बनाया गया erection ताकि सर्जन मोड़ देख और माप सकें।

Circumcision

चमड़ी हटाना — अगर पहले नहीं हुई तो अक्सर एक साथ किया जाता है।

Penile rehabilitation

ठीक होने के दौरान erection tablet और/या vacuum device का उपयोग — erections और लंबाई की सुरक्षा के लिए।

जनरल एनेस्थीसिया

दवा जो सर्जरी के दौरान आपको नींद और दर्द-मुक्त रखती है।

क्या इसमें दर्द होगा? सर्जरी जनरल एनेस्थीसिया या spinal anesthesia में होती है, इसलिए उस दौरान कुछ महसूस नहीं होता। बाद में 1-2 हफ्ते लिंग में सूजन, नील और दर्द रहता है — बर्फ, सहारा और दर्द-निवारक दवा से राहत मिलती है। यह plication से लंबी सर्जरी है (अक्सर 1.5-3 घंटे) और एक रात रुकना पड़ सकता है। catheter लगाया जाता है जो अगली सुबह निकाल लिया जाता है।

तैयारी कैसे करें (सर्जरी से पहले)

- **जनरल एनेस्थीसिया या spinal anesthesia** में होती है — सभी निर्देश मानें (उपवास और कौन-सी दवाएँ, जैसे blood thinners, बंद करनी हैं)।
- आपकी Peyronie's स्थिर होनी चाहिए (महीनों से मोड़ और दर्द में बदलाव नहीं) और **erections पहले जाँची जाती हैं** — इस सर्जरी के लिए अच्छा erectile function जरूरी है।
- **धूम्रपान न करें**; कोई संक्रमण हो तो पहले ठीक करें और antibiotics दी जाएँगी। Circumcision नहीं हुई तो अक्सर साथ में की जाती है।

अपनी टीम को पहले ही बताएँ यदि:

- **कमज़ोर erections** हैं, या erection के लिए दवा/injection की जरूरत है
- Blood thinner लेते हैं, या पहले लिंग की सर्जरी हो चुकी है

सर्जरी के दौरान क्या होता है

- 1 एनेस्थीसिया में आप सोए या सुन्न रहते हैं; antibiotics दी जाती हैं।
- 2 **injection से erection बनाई जाती है** ताकि मोड़ दिखे; त्वचा उठाई जाती है और लिंग के ऊपर की नसें सावधानी से हटाई जाती हैं।
- 3 छोटे हिस्से पर निशान **काटा जाता है (कभी-कभी आंशिक रूप से हटाया भी जाता है)**, गैप को **ग्राफ्ट** से भरा जाता है; परिणाम जाँचकर त्वचा बंद की जाती है।

बाद में

- 1-2 हफ्ते **सूजन, नील और दर्द** रहेगा। लिंग के सिरे का **सुन्न होना** आम है और महीनों में सामान्यतः ठीक होता है।
- Catheter अगली सुबह निकाल लिया जाता है।
- Graft ठीक हो सके इसलिए **लगभग 6-8 हफ्ते यौन संबंध से बचें**।
- आपकी टीम **penile rehabilitation** शुरू करेगी — कम dose की erection tablet और/या daily vacuum device — erections और लंबाई की सुरक्षा के लिए।

यदि आपको ये हों तो अपनी चिकित्सा टीम को बुलाएँ:

- बुखार या ठंड लगना, या घाव पर बढ़ती लालिमा, दर्द, सूजन या रिसाव
- पेशाब नहीं आ रहा
- गंभीर या बढ़ती सूजन या दर्द, या भारी रक्तस्राव

याद रखने योग्य तीन बातें

1. यह सर्जरी छोटे हिस्से का निशान काटकर और ग्राफ्ट से गैप भरकर मोड़ दूर करती है — **लंबाई बनी रहती है** और गंभीर या जटिल मोड़ के लिए है।
2. इसमें plication से **ED का खतरा अधिक** है, इसलिए केवल मजबूत erections वालों को दी जाती है; शुरुआती सुन्नपन आम है और सामान्यतः ठीक होता है।
3. Peyronie's स्थिर और erections जाँची हुई होनी चाहिए; धूम्रपान न करें। बाद में ~6-8 हफ्ते यौन संबंध से बचें और penile rehabilitation करें। बुखार, गंभीर सूजन, या पेशाब न आने पर तुरंत बुलाएँ।