

यूरोडायनेमिक्स (Urodynamics) जाँचों का एक समूह है जो यह मापता है कि आपका मूत्राशय पेशाब को कितनी अच्छी तरह रोकता और निकालता है। पतले, मुलायम catheters दबाव मापते हैं जब मूत्राशय धीरे-धीरे भरा और फिर खाली किया जाता है। लक्ष्य यह है कि आपके लक्षण क्लिनिक में ही दोबारा आएँ, ताकि आपकी टीम सही कारण खोज सके और सही इलाज तय कर सके।

इस जाँच के बारे में

Urodynamics एक नहीं बल्कि कई जाँचें एक साथ होती हैं। आपकी ज़रूरत के अनुसार इनमें शामिल हो सकते हैं:

- **Flow test** — आप एक खास toilet में पेशाब करते हैं जो आपकी धार मापता है; टीम यह भी देखती है कि कितना पेशाब पीछे रह गया।
- **Filling study** — मूत्राशय को धीरे-धीरे भरा जाता है, दबाव मापा जाता है, और आप बताते हैं कि आपको क्या महसूस हो रहा है।
- **Pressure-flow study** — पेशाब करते समय दबाव मापा जाता है।
- कभी-कभी उसी दौरान **X-ray तस्वीरें** भी ली जाती हैं (video urodynamics)।

दो पतले catheters उपयोग किए जाते हैं: एक मूत्राशय में (मूत्रमार्ग से) और एक छोटा मलाशय (या योनि) में — ताकि मूत्राशय का दबाव और पेट के दबाव को अलग पहचाना जा सके।

क्या यह सुरक्षित है?

हाँ। Urodynamics एक कम-जोखिम वाली, संवादात्मक जाँच है। मुख्य जोखिम catheters से है — थोड़ी जलन और मूत्र संक्रमण (UTI) की छोटी संभावना। आपको antibiotic दी जा सकती है। कोई सर्जरी नहीं होती और ठीक होने का समय नहीं चाहिए।

शब्दों को समझें

Urodynamics

जाँचों का समूह जो मूत्राशय के भरने और खाली होने को मापता है।

मूत्राशय (Bladder)

वह मांसपेशी की थैली जो पेशाब जमा रखती है।

Catheter

मूत्राशय भरने और दबाव मापने के लिए उपयोग की जाने वाली पतली, मुलायम नली।

Filling study

मूत्राशय भरते समय दबाव और संवेदना मापता है।

Pressure-flow study

पेशाब करते समय दबाव मापता है।

Flow test

पेशाब की धार की गति और पैटर्न मापता है।

Video urodynamics

वही जाँच जिसमें अधिक जानकारी के लिए X-ray तस्वीरें भी शामिल होती हैं।

Post-void residual

पेशाब के बाद मूत्राशय में बचा हुआ पेशाब।

क्या इसमें दर्द होगा? अधिकांश लोगों को catheters से दर्द की जगह दबाव और थोड़ी असहजता महसूस होती है। जाँच के दौरान आपसे खाँसने, करवट बदलने और पेशाब करने के लिए कहा जाएगा — टीम आपको ढककर रखती है और आपकी गति से काम करती है। इसमें लगभग 30–60 मिनट लगते हैं और आप सीधे घर जा सकते हैं।

तैयारी कैसे करें (जाँच से पहले)

- आपको **आरामदायक रूप से भरे हुए मूत्राशय** के साथ आने के लिए कहा जा सकता है — जो निर्देश मिलें उनका पालन करें।
- अपनी **सामान्य दवाएँ** लें, लेकिन पूछें कि क्या कोई **मूत्राशय की दवा रोकनी है**, क्योंकि वे नतीजे बदल सकती हैं।
- Sedation की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए आप **खुद गाड़ी चलाकर घर जा सकते** हैं।

जाँच से **पहले** अपनी टीम को बताएँ यदि आप:

- UTI के लक्षण** हैं (जलन, बुखार, या धुंधला/तेज़ बदबूदार पेशाब) — सक्रिय संक्रमण होने पर जाँच दोबारा निर्धारित की जा सकती है
- Blood thinner लेते हैं, या कोई एलर्जी है (latex सहित)

जाँच से पहले संक्रमण जाँचने के लिए **पेशाब का नमूना** माँगा जा सकता है।

जाँच के दौरान क्या होता है

- आप एक खास toilet में पेशाब करते हैं जो धार मापता है; टीम यह भी देखती है कि कितना पेशाब पीछे रह गया।
- पतले catheters धीरे से लगाए जाते हैं — एक मूत्राशय में और एक छोटा मलाशय या योनि में।
- मूत्राशय धीरे-धीरे भरा जाता है; आप बताते हैं कि पहली बार भरावट कब महसूस हुई और तीव्र इच्छा कब हुई — खाँसने या करवट बदलने के लिए भी कहा जा सकता है।
- दबाव रिकॉर्ड होते समय आप पेशाब करते हैं, फिर catheters निकाल लिए जाते हैं।

बाद में

- आप **तुरंत सामान्य गतिविधियाँ** फिर शुरू कर सकते हैं।
- एक-दो दिन **पेशाब करते समय हल्की जलन** हो सकती है। अधिक पानी पीने से यह कम होती है।
- कुछ समय के लिए पेशाब में **हल्का गुलाबी रंग** आ सकता है। यह सामान्य है और आमतौर पर एक दिन में ठीक हो जाता है।

यदि आपको ये हों तो अपनी चिकित्सा टीम को बुलाएँ:

- बुखार या ठंड लगना
- पेशाब करने में परेशानी, या बिल्कुल पेशाब न आना
- अधिक रक्तस्राव, या पेशाब में खून के थक्के
- दर्द जो बेहतर होने की जगह बढ़ता जाए

याद रखने योग्य तीन बातें

- Urodynamics मापता है कि आपका मूत्राशय कैसे भरता और खाली होता है, ताकि टीम रिसाव, तीव्र इच्छा, या खाली न होने का सही कारण खोज सके।
- तैयारी बहुत कम है — पूछें कि क्या कोई मूत्राशय की दवा रोकनी है, कहा जाए तो भरे मूत्राशय के साथ आएँ, और संक्रमण के लक्षण बताएँ।
- दर्द की जगह दबाव की उम्मीद रखें और सीधे घर जाएँ। एक दिन जलन या हल्का गुलाबी पेशाब सामान्य है — अधिक पानी पिएँ, और बुखार, अधिक रक्तस्राव, या पेशाब में परेशानी पर फोन करें।