

# वाँडिंग सिस्टोयूरेथोग्राम (VCUG)

रोगी जानकारी · मूत्राशय और मूत्रमार्ग के X-ray से पहले क्या उम्मीद करें

WARWIKI

**वाँडिंग सिस्टोयूरेथोग्राम — या “VCUG” — एक X-ray जाँच है जो आपके मूत्राशय में एक विशेष dye भरकर और पेशाब करते समय तस्वीरें लेती है। यह दिखाता है कि मूत्राशय कैसे भरता और खाली होता है, और गुदों की ओर मूत्र का उल्टा बहाव (reflux), संकुचन, या रिसाव जैसी समस्याओं की पहचान करता है।**

## इस जाँच के बारे में

आपका मूत्राशय पेशाब जमा करता है, और मूत्रमार्ग वह नली है जो इसे बाहर ले जाती है। VCUG में मूत्राशय को एक dye से भरा जाता है जो X-ray पर सफ़ेद दिखती है, फिर पेशाब करते समय तस्वीरें ली जाती हैं। क्योंकि यह मूत्राशय और मूत्रमार्ग को *क्रिया में* दिखाता है, यह वह चीज़ें भी दिखा सकता है जो सामान्य तस्वीर में नहीं दिखतीं।

**आपकी चिकित्सा टीम VCUG इन कारणों से करवा सकती है:**

- मूत्राशय का भरना और खाली होना देखना
- जाँचना कि पेशाब गुदों की ओर उल्टा तो नहीं जा रहा (reflux)
- पेशाब करते समय मूत्राशय की गर्दन और मूत्रमार्ग देखना
- संकुचन, रिसाव, या छोटी थैली (diverticulum) खोजना
- मूत्राशय, प्रोस्टेट, या मूत्रमार्ग की सर्जरी के बाद ठीक होना जाँचना

यह जाँच आपके निचले मूत्र मार्ग — मूत्राशय और मूत्रमार्ग — की जाँच करती है। यह देखभाल का मार्गदर्शन करती है, उपचार नहीं।

## क्या यह सुरक्षित है?

हाँ। VCUG एक सामान्य, कम जोखिम वाली जाँच है। उपयोग किया गया X-ray बहुत कम होता है, और dye पेशाब के साथ बाहर निकल जाती है। सबसे आम समस्या catheter से हल्का मूत्र मार्ग संक्रमण (UTI) है — इसीलिए साफ़ तकनीक अपनाई जाती है और कभी-कभी antibiotic दी जाती है। हल्की जलन या थोड़ा खून सामान्यतः अपने आप ठीक हो जाता है।

## शब्दों को समझें

### मूत्राशय (Bladder)

वह अंग जो पेशाब जमा करता है।

### मूत्रमार्ग (Urethra)

वह नली जो मूत्राशय से पेशाब बाहर ले जाती है।

### Catheter

एक पतली, मुलायम नली जो मूत्राशय को खाली या भरती है। यदि आपके पास पहले से है, तो उसी से dye डाली जाती है; नहीं तो मूत्रमार्ग से एक नई नली डाली जाती है।

### सुप्राप्यूबिक tube (SPT)

एक catheter जो पेट के नीचे एक छोटे छेद से मूत्राशय को खाली करती है। यदि आपके पास है, तो इससे मूत्राशय भरा जा सकता है।

### Contrast dye

एक तरल पदार्थ जो X-ray पर सफ़ेद दिखता है ताकि मूत्राशय और मूत्रमार्ग नज़र आ सकें।

### Voiding

पेशाब करना — मूत्राशय खाली करना। मुख्य तस्वीरें voiding के दौरान ली जाती हैं।

### Reflux

जब पेशाब मूत्राशय से गुदों की ओर उल्टा बहता है। VCUG यह दिखा सकता है।

### Fluoroscopy

एक प्रकार का X-ray जो dye बहने पर live, चलती तस्वीरें दिखाता है।

### Post-void image

पेशाब के बाद ली गई तस्वीर, यह देखने के लिए कि मूत्राशय कितना खाली हुआ।

**क्या इसमें दर्द होगा?** यदि आपके पास पहले से catheter या suprapubic tube है, तो dye उसी से जाती है — कुछ नया नहीं लगाया जाता। अन्यथा पहले एक पतला catheter लगाया जाता है (हल्का दबाव या जलन)। जाँच के दौरान पेशाब करने के लिए कहा जाना सामान्य है। जाँच लगभग 30 मिनट लेती है।

## तैयारी कैसे करें (जाँच से पहले)

तैयारी बहुत कम है। अधिकतर मामलों में:

- यदि आपके पास पहले से **urinary catheter या suprapubic tube** है, तो उसे लगा रहने दें — आमतौर पर उसी से मूत्राशय भरा जाएगा।
- आप **सामान्य रूप से खा-पी सकते हैं** और अपनी **नियमित दवाएँ** ले सकते हैं, जब तक टीम अन्यथा न कहे।
- अधिकतर वयस्कों को sedation नहीं चाहिए, इसलिए आप **खुद गाड़ी चलाकर घर** जा सकते हैं।

## पहले से अपनी टीम को बताएँ यदि:

- कभी X-ray contrast dye या iodine से reaction हुई हो
- आप blood thinner लेते हों
- **गर्भावस्था की संभावना हो** — गर्भावस्था में X-ray आमतौर पर नहीं की जाती
- UTI के लक्षण हों (जलन, बुखार, या बदबूदार पेशाब) — सक्रिय संक्रमण में जाँच टाली जा सकती है

आपसे **पेशाब का नमूना** लिया जा सकता है और संक्रमण के जोखिम को कम करने के लिए **antibiotic** दी जा सकती है।

## जाँच के दौरान क्या होता है

- 1 आप एक X-ray table पर लेटते हैं।
- 2 **Dye आपके मूत्राशय में डाली जाती है।** यदि आपके पास **suprapubic tube या urethral catheter** है, तो उसी से — **कुछ नया नहीं लगाया जाता।** नहीं तो मूत्रमार्ग से एक पतला catheter डाला जाता है।
- 3 नली से धीरे-धीरे dye मूत्राशय में भरी जाती है। आपको पेशाब जैसी भरावट महसूस होगी। भरते समय तस्वीरें ली जाती हैं।
- 4 जब मूत्राशय भर जाए, तो आपको **X-ray की recording के दौरान पेशाब करने** के लिए कहा जाएगा — यह जाँच का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। Catheter आमतौर पर पहले हटाई जाती है; suprapubic tube को थोड़ी देर बंद किया जा सकता है।
- 5 खाली होने के बाद एक अंतिम तस्वीर ली जा सकती है।

## बाद में

- आप आमतौर पर घर जाकर **तुरंत सामान्य गतिविधियाँ** शुरू कर सकते हैं।
- एक-दो दिन पेशाब में **हल्की जलन** या थोड़ा **खून या गुलाबी रंग** हो सकता है — अधिक पानी पीने से मदद मिलती है।
- यदि **catheter या suprapubic tube** है, तो टीम देखभाल बताएगी। Dye कुछ घंटों में पेशाब के साथ निकल जाती है।

### यदि आपको ये हों तो अपनी चिकित्सा टीम को बुलाएँ:

- बुखार या ठंड लगना
- पेशाब करने में तकलीफ, या बिल्कुल पेशाब न आना
- बहुत अधिक रक्तस्राव, या रुकने वाला न हो
- दर्द जो बेहतर होने की बजाय बढ़ता जाए

## याद रखने योग्य तीन बातें

1. VCUG एक सुरक्षित X-ray है जो मूत्राशय को dye से भरकर पेशाब करते समय फ़िल्म करती है — यह दिखाती है कि मूत्राशय और मूत्रमार्ग कैसे काम करते हैं और reflux जैसी समस्याएँ खोजती है।
2. तैयारी कम है: खाएँ, पीएँ, और दवाएँ लें — लेकिन dye allergy, blood thinners, गर्भावस्था की संभावना, या UTI के लक्षणों के बारे में टीम को बताएँ।
3. Dye मौजूदा catheter या suprapubic tube से जाती है, नहीं तो एक पतली नली लगाई जाती है; फिर filming के दौरान पेशाब करें। एक दिन हल्की जलन या थोड़ा खून सामान्य है — अधिक पानी पीएँ, और बुखार, अत्यधिक रक्तस्राव, या पेशाब में तकलीफ हो तो कॉल करें।