

Thuốc Chủ Vận Beta-3 (cho Bàng Quang Tăng Hoạt)

Thông tin cho bệnh nhân · Thuốc bàng quang thể hệ mới, ít khô miệng hơn

WARWIKI

Thuốc chủ vận beta-3 là nhóm thuốc mới điều trị **bàng quang tăng hoạt** — tiểu gấp, tiểu nhiều lần và tiểu không kiểm soát do tiểu gấp. Thuốc làm thư giãn bàng quang để chứa nhiều nước tiểu hơn, và gây **ít khô miệng, táo bón và ảnh hưởng trí nhớ hơn** so với nhóm thuốc kháng cholinergic cũ. Hai loại thuốc trong nhóm này là **mirabegron (Myrbetriq)** và **vibegron (Gemtesa)**.

Cơ chế hoạt động

Thuốc kích hoạt **thụ thể beta-3** trong thành bàng quang, giúp **thư giãn cơ bàng quang** khi tích trữ nước tiểu. Khi bàng quang được thư giãn, bạn sẽ ít bị tiểu gấp và tiểu ít lần hơn — qua cơ chế khác với thuốc kháng cholinergic.

Điều bạn có thể mong đợi

- Hiệu quả xuất hiện sau **vài tuần**; uống **một lần mỗi ngày**.
- Thường **dùng nạp tốt** — ít hoặc không gây khô miệng.
- Phù hợp cho **người cao tuổi** hoặc người từng bị khô miệng hay tác dụng phụ khác từ thuốc kháng cholinergic.
- Đôi khi có thể kết hợp với thuốc kháng cholinergic khi triệu chứng khó kiểm soát.

GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ

Bàng quang tăng hoạt (OAB)

Tiểu gấp và tiểu nhiều lần do bàng quang co bóp quá sớm.

Thuốc chủ vận beta-3

Thuốc làm thư giãn bàng quang qua thụ thể beta-3.

Mirabegron / vibegron

Hai loại thuốc trong nhóm này.

Kháng cholinergic

Nhóm thuốc OAB cũ hơn; thuốc chủ vận beta-3 tránh được nhiều tác dụng phụ của nhóm này.

Huyết áp

Mirabegron có thể làm tăng huyết áp nhẹ — cần theo dõi.

TẠI SAO CHỌN THUỐC NÀY THAY VÌ THUỐC CŨ? Thuốc chủ vận beta-3 có hiệu quả tương đương thuốc kháng cholinergic cho bàng quang tăng hoạt nhưng **ít khô miệng và táo bón hơn nhiều**, không gây lo ngại về trí nhớ — vì vậy thường được ưu tiên, đặc biệt cho người cao tuổi. Điều chỉnh cần theo dõi là huyết áp.

Cách dùng thuốc

- Uống **một lần mỗi ngày** theo hướng dẫn; cho thuốc vài tuần để phát huy tác dụng.
- Kết hợp với tập luyện bàng quang và bài tập cơ sàn chậu để đạt kết quả tốt nhất.
- Tái khám đúng hẹn để nhóm chăm sóc kiểm tra hiệu quả và huyết áp của bạn.

Lưu ý an toàn quan trọng

- **Mirabegron có thể làm tăng huyết áp** — cần theo dõi, và tránh dùng nếu huyết áp quá cao hoặc không kiểm soát được. (Vibegron ít ảnh hưởng đến huyết áp.)
- Báo cho nhóm chăm sóc biết các thuốc khác bạn đang dùng — mirabegron có thể ảnh hưởng nồng độ một số thuốc.
- Như với mọi điều trị OAB, báo ngay nếu bạn khó đi tiểu.

Tác dụng phụ thường gặp

- Thường nhẹ — đau đầu, nghẹt mũi
- Tăng huyết áp (chủ yếu với mirabegron)
- Nhiễm trùng đường tiết niệu, hoặc táo bón nhẹ

Hãy gọi cho nhóm chăm sóc nếu bạn có:

- **Huyết áp rất cao**, hoặc đau đầu dữ dội
- Bạn **không thể đi tiểu** hoặc cảm thấy bàng quang không xả hết
- Sưng mắt, môi hoặc lưỡi, hoặc khó thở (dị ứng hiếm gặp) — gọi cấp cứu ngay

BA ĐIỀU CẦN NHỚ

1. Thuốc chủ vận beta-3 làm thư giãn bàng quang để giảm triệu chứng tăng hoạt, với **ít khô miệng hơn nhiều** so với thuốc cũ.
2. Thường phù hợp cho người cao tuổi hoặc sau khi bị tác dụng phụ của thuốc kháng cholinergic; cho thuốc vài tuần.
3. Mirabegron có thể tăng huyết áp — đi khám đúng hẹn. Gọi ngay nếu không đi tiểu được hoặc huyết áp tăng đột ngột.