

Botox Bàng Quang (Kiểm Soát Tiểu Tiễn)

Thông tin cho bệnh nhân · Tiêm làm dịu bàng quang tăng hoạt

WARWIKI

Botox bàng quang là phương pháp điều trị **bàng quang tăng hoạt** — tiểu gấp, tiểu nhiều lần và tiểu không kiểm soát do tiểu gấp — khi thay đổi lối sống và thuốc chưa đủ hiệu quả. Lượng nhỏ độc tố botulinum (Botox) được tiêm vào cơ bàng quang qua một ống soi nhỏ để làm giãn cơ. Hiệu quả xuất hiện sau **1–2 tuần** và thường kéo dài khoảng 6 tháng.

Cơ chế hoạt động

Cơ bàng quang tăng hoạt co bóp khi không cần thiết. Botox **làm giãn cơ đó**, ngăn co bóp không kiểm soát — giảm tiểu gấp, tiểu nhiều lần và tiểu không kiểm soát do tiểu gấp. Thuốc không có tác dụng ngay; bạn sẽ thấy cải thiện sau **1–2 tuần**.

Có an toàn không?

Có, đây là phương pháp đã được chứng minh. Điều quan trọng cần biết là Botox làm giãn bàng quang, đôi khi khiến việc **làm trống bàng quang hoàn toàn trở nên khó khăn hơn** — một số ít người cần **tự thông tiểu tạm thời** cho đến khi thuốc hết tác dụng. Vì vậy, bạn cần sẵn sàng và có khả năng học cách tự thông tiểu nếu cần. Các tác dụng phụ khác gồm nhiễm trùng đường tiết niệu và tiểu ra máu thoáng qua.

GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ

Bàng quang tăng hoạt

Tiểu gấp và tiểu nhiều lần do bàng quang co bóp quá sớm.

Độc tố botulinum (Botox)

Thuốc làm giãn cơ khi được tiêm vào.

Cơ bàng quang (Detrusor)

Cơ bàng quang được tiêm thuốc.

Ống soi bàng quang (Cystoscope)

Camera nhỏ dùng để đưa thuốc tiêm vào.

Tự thông tiểu

Dùng ống thông nhỏ để làm trống bàng quang, đôi khi cần thiết tạm thời.

Nước tiểu tồn dư sau tiểu

Nước tiểu còn lại sau khi đi tiểu — được kiểm tra sau thủ thuật.

CÓ ĐAU KHÔNG? Thuốc tê được đưa vào bàng quang trước, nên hầu hết mọi người chỉ cảm thấy áp lực nhẹ trong khi tiêm. Đây thường là **thủ thuật tại phòng khám dưới gây tê tại chỗ**, khoảng 10–15 phút, và bạn về nhà ngay sau đó.

Cách chuẩn bị

- **Xét nghiệm nước tiểu** trước để loại trừ nhiễm trùng.
- Bạn có thể được dùng **kháng sinh** trước và sau thủ thuật.
- Thông báo cho nhóm chăm sóc về các **thuốc chống đông máu**, và sẵn sàng học tự thông tiểu để phòng nếu cần.

Quá trình thực hiện

- 1 Đưa dịch gây tê vào bàng quang.
- 2 Đưa **ống soi bàng quang** mỏng qua niệu đạo.
- 3 Tiêm Botox vào thành bàng quang tại nhiều điểm nhỏ.
- 4 Rút ống soi ra — toàn bộ quá trình khoảng 10–15 phút.

Sau khi thực hiện

- Cảm giác rất nhẹ hoặc tiểu ra ít máu trong một hoặc hai ngày là bình thường.
- Hiệu quả tăng dần trong 1–2 tuần; tác dụng kéo dài khoảng 6 tháng và có thể **lặp lại**.

Hãy gọi cho nhóm chăm sóc nếu bạn có:

- **Không tiểu được** hoặc cảm thấy bàng quang chưa trống hết
- Sốt hoặc ớn lạnh (có thể là nhiễm trùng)
- Chảy máu nhiều hoặc có cục máu trong nước tiểu
- Cảm giác rất nặng hơn sau vài ngày

Thông tin thêm

- Khả năng làm trống bàng quang thường được **kiểm tra** sau thủ thuật.
- Nếu cần tiêm lại, các lần tiêm cách nhau vài tháng.

BA ĐIỀU CẦN NHỚ

1. Botox bàng quang làm giãn cơ bàng quang tăng hoạt, giảm tiểu gấp, tiểu nhiều lần và tiểu không kiểm soát; tác dụng xuất hiện sau 1–2 tuần và kéo dài khoảng 6 tháng.
2. Đây là thủ thuật nhanh tại phòng khám với gây tê; điểm cần lưu ý là một số người cần tự thông tiểu tạm thời.
3. Gọi ngay nếu bạn không tiểu được hoặc bị sốt sau thủ thuật.