

Phẫu thuật khâu kín âm đạo (Colpocleisis)

Thông tin cho bệnh nhân · Phẫu thuật đơn giản, lâu bền để điều trị sa tạng chậu bằng cách khâu kín âm đạo

WARWIKI

Colpocleisis (phẫu thuật khâu kín âm đạo) là một phẫu thuật hiệu quả cao, ít xâm lấn để điều trị sa tạng chậu, bằng cách **khâu kín phần lớn ống âm đạo** nhằm giữ các tạng vào đúng vị trí một cách lâu dài. Vì phẫu thuật này đóng kín âm đạo, nó được lựa chọn bởi những người chắc chắn không còn muốn quan hệ tình dục qua âm đạo. Thủ thuật nhanh, nhẹ nhàng với cơ thể và rất thành công — đặc biệt phù hợp với người cao tuổi hoặc có vấn đề sức khỏe khác.

Về ca phẫu thuật này

Thay vì tái tạo lại cấu trúc nâng đỡ, colpocleisis **cắt bỏ một dải niêm mạc âm đạo rồi khâu hai thành lại với nhau**, thu ngắn và đóng kín ống âm đạo để các tạng không còn sa xuống được. Có thể thực hiện khi tử cung vẫn còn hoặc sau khi đã cắt tử cung. Do không cần tái tạo phức tạp, thủ thuật nhanh hơn và ít rủi ro hơn các phẫu thuật sa tạng khác, với tỷ lệ thành công trên **90%**.

Quyết định quan trọng

Điều cần lưu ý: sau colpocleisis, **quan hệ tình dục qua âm đạo không còn khả thi**, và thay đổi này là vĩnh viễn. Với những người đã chắc chắn về điều này, mức độ hài lòng rất cao. Nhóm chăm sóc sẽ đảm bảo đây là lựa chọn phù hợp và không có vấn đề nào khác (ví dụ cần đánh giá tử cung) trước khi tiến hành.

GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ

Sa tạng chậu

Khi các tạng vùng chậu bị sa xuống gây cảm giác phình hoặc nặng nề.

Colpocleisis

Phẫu thuật khâu kín phần lớn ống âm đạo để nâng đỡ các tạng.

Phẫu thuật bó lòng

Phương pháp khâu kín (thay vì tái tạo) âm đạo.

LeFort

Một kỹ thuật colpocleisis thực hiện khi tử cung vẫn còn tại chỗ.

Băng nâng (sling)

Hỗ trợ đôi khi được thêm vào cùng lúc để điều trị tiểu không kiểm soát.

CÓ ĐAU KHÔNG? Phẫu thuật được thực hiện dưới gây mê (thường là tê tùy sống hoặc gây mê toàn thân), nên bạn không cảm thấy gì trong quá trình mổ. Thủ thuật thường ngắn. Sau mổ, hầu hết bệnh nhân chỉ cảm thấy khó chịu nhẹ và hồi phục nhanh — đây là một trong những ca phẫu thuật sa tạng dễ hồi phục nhất.

Cách chuẩn bị

- **Chắc chắn về quyết định** không quan hệ tình dục qua âm đạo nữa.
- Tuân theo **hướng dẫn gây mê/gây tê** (nhịn ăn, ngừng thuốc làm loãng máu theo chỉ dẫn).
- Đánh giá trước mổ; đôi khi **thêm băng nâng** nếu bạn cũng bị tiểu không kiểm soát.
- Sắp xếp người đưa về và hỗ trợ tại nhà.

Quá trình phẫu thuật

- 1 Bạn được gây mê/gây tê; kháng sinh được dùng phòng ngừa.
- 2 Các dải niêm mạc âm đạo được cắt bỏ, hai thành được **khâu lại với nhau**, đóng kín ống âm đạo.
- 3 Ống thông tiểu và đôi khi gạc âm đạo được đặt trong thời gian ngắn.

Sau phẫu thuật

- Thường **ra về trong ngày hoặc qua một đêm**; hồi phục nhẹ nhàng.
- Ống thông tiểu dùng trong thời gian ngắn; ra ít máu là bình thường.
- **Tránh nâng vật nặng và rặn** trong vài tuần; điều trị táo bón nếu có.

Hãy gọi cho nhóm chăm sóc nếu bạn có:

- Sốt hoặc ớn lạnh
- Chảy máu nhiều
- **Không tiểu được** sau khi rút ống thông
- Đau vùng chậu ngày càng nặng hơn

BA ĐIỀU CẦN NHỚ

1. Colpocleisis khâu kín phần lớn âm đạo để điều trị sa tạng — nhanh, rất bền lâu, và lý tưởng khi bạn muốn phẫu thuật đơn giản, ít rủi ro.
2. Sự đánh đổi là vĩnh viễn: **quan hệ tình dục qua âm đạo không còn khả thi** — phù hợp với những ai đã chắc chắn về điều này.
3. Hồi phục thường dễ dàng. Tránh rặn, và gọi cho nhóm chăm sóc nếu sốt, chảy máu nhiều hoặc khó tiểu.