

Chụp X-quang bàng quang

WARWIKI

Thông tin cho bệnh nhân · Chụp X-quang bàng quang bằng thuốc cản quang

Chụp X-quang bàng quang (cystogram) là xét nghiệm X-quang ngắn để kiểm tra bàng quang. Bàng quang được bơm nhẹ nhàng bằng thuốc cản quang qua ống thông để hiện rõ trên X-quang. Điều này giúp bác sĩ kiểm tra xem vị trí phẫu thuật đã lành và kín hay chưa, hoặc tìm rò rỉ, đường rò bất thường, hay nước tiểu trào ngược về phía thận.

Về xét nghiệm này

Bàng quang thường khó nhìn thấy trên X-quang thông thường. Chụp X-quang bàng quang bơm **thuốc cản quang** hiện màu trắng vào bàng quang để thấy hình dạng và khả năng chứa, giải phóng nước tiểu. Bác sĩ có thể chỉ định xét nghiệm này để:

- Xác nhận **vị trí phẫu thuật đã lành** và không rò rỉ — thường trước khi rút ống thông
- Tìm **rò rỉ** sau chấn thương hoặc phẫu thuật
- Phát hiện kết nối bất thường (**đường rò**) giữa bàng quang và cơ quan khác
- Kiểm tra nước tiểu trào ngược về phía thận (**trào ngược**)

Cách đưa thuốc vào phụ thuộc vào tình trạng của bạn:

- Nếu bạn **chưa có ống thông**, một ống thông nhỏ sẽ được đặt chỉ để làm xét nghiệm.
- Nếu bạn đã có **ống thông niệu đạo** hoặc **ống thông bàng quang trên xương mu**, thuốc thường được bơm qua đó — không cần đặt ống mới.

Có an toàn không?

Có. Chụp X-quang bàng quang là xét nghiệm phổ biến, ít rủi ro. Lượng tia X nhỏ và thuốc cản quang tan trong nước sẽ thải ra ngoài theo nước tiểu. Hầu hết mọi người chỉ cảm thấy căng tức hoặc áp lực nhẹ. Tác dụng phụ không thường gặp — nhiễm trùng đường tiết niệu, rất ngắn, hoặc co cứng — thường nhẹ và qua nhanh.

GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ

Chụp X-quang bàng quang

X-quang bàng quang khi bàng quang đang được bơm đầy thuốc cản quang.

Bàng quang

Túi cơ chứa nước tiểu cho đến khi bạn đi tiểu.

Thuốc cản quang

Chất lỏng hiện màu trắng trên X-quang giúp nhìn thấy bàng quang.

Ống thông

Ống mềm, mỏng dùng để bơm thuốc cản quang vào bàng quang.

Ống thông bàng quang trên xương mu

Ống thông dẫn lưu bàng quang qua thành bụng dưới; thuốc có thể bơm qua đây.

Đường rò

Kết nối bất thường giữa bàng quang và cơ quan khác mà xét nghiệm này có thể phát hiện.

Trào ngược

Nước tiểu chảy ngược từ bàng quang về phía thận.

Hình ảnh khi đi tiểu

Ảnh X-quang chụp thêm khi bạn đi tiểu, nếu cần.

CÓ ĐAU KHÔNG? Hầu hết mọi người chỉ cảm thấy căng tức hoặc áp lực nhẹ khi bàng quang được bơm đầy, không phải đau nhói. Nếu phải đặt ống thông cho xét nghiệm, bạn có thể cảm thấy rất nhẹ trong chốc lát. Nhóm kỹ thuật viên có thể làm chậm hoặc dừng lại bất cứ lúc nào — chỉ cần báo cho họ. Xét nghiệm thường kéo dài khoảng 15–30 phút.

Cách chuẩn bị (Trước khi làm xét nghiệm)

Bạn cần chuẩn bị rất ít. Trong hầu hết các trường hợp:

- Bạn có thể **ăn uống bình thường** và uống **thuốc thường ngày** trừ khi được dặn khác.
- Nếu bạn có ống thông hoặc ống thông bàng quang trên xương mu, hãy **giữ nguyên** — thuốc thường được bơm qua đó.
- Bạn thường có thể **tự lái xe về nhà** vì không cần dùng thuốc an thần.

Hãy báo trước cho nhóm chăm sóc nếu bạn:

- Từng bị dị ứng với thuốc cản quang X-quang hoặc iốt
- Đang dùng thuốc chống đông máu
- Có dấu hiệu nhiễm trùng đường tiết niệu (rất khi tiểu, sốt, hoặc nước tiểu đục, mùi nặng) — nhiễm trùng đang tiến triển có thể cần hoãn xét nghiệm

Quá trình làm xét nghiệm

- 1 Bạn nằm trên bàn X-quang. Nếu chưa có ống thông, một ống thông nhỏ sẽ được đặt nhẹ nhàng; nếu đã có, ống sẽ được nối vào.
- 2 Thuốc cản quang được bơm chậm vào bàng quang trong khi chụp X-quang. Bạn có thể được yêu cầu nằm yên và thở bình thường.
- 3 Bạn có thể được yêu cầu **đi tiểu** để chụp thêm ảnh bàng quang khi đang xả (khi đây là một phần của xét nghiệm).
- 4 Ảnh được xem xét và ống thông được rút — hoặc ống hiện có được giữ nguyên.

Sau khi làm xét nghiệm

- Bạn thường có thể về nhà và **sinh hoạt bình thường ngay**.
- Bạn có thể cảm thấy **rất nhẹ khi đi tiểu** trong một ngày. Uống nhiều nước giúp giảm bớt cảm giác này.
- Nước tiểu có thể có **màu hồng nhạt** trong thời gian ngắn. Điều này thường gặp và thường tự hết trong vòng một ngày.

Hãy gọi cho nhóm chăm sóc nếu bạn có:

- Sốt hoặc ớn lạnh
- Khó đi tiểu hoặc hoàn toàn không đi tiểu được
- Chảy máu nhiều hoặc có cục máu đông trong nước tiểu
- Đau hoặc co thắt bụng ngày càng nặng hơn

BA ĐIỀU CẦN NHỚ

1. Chụp X-quang bàng quang là xét nghiệm X-quang nhanh, an toàn, bơm thuốc cản quang vào bàng quang — để kiểm tra vết mổ đã lành hay tìm rò rỉ, đường rò, hoặc trào ngược.
2. Cần chuẩn bị rất ít. Giữ nguyên ống thông hoặc ống thông bàng quang trên xương mu nếu có, và báo trước cho nhóm chăm sóc về dị ứng thuốc cản quang, thuốc chống đông, hoặc dấu hiệu nhiễm trùng.
3. Hầu hết mọi người chỉ cảm thấy căng tức và về nhà ngay. Rất nhẹ hoặc nước tiểu hơi hồng trong một ngày là bình thường — uống nhiều nước và gọi ngay khi bị sốt, chảy máu nhiều, hoặc không đi tiểu được.