

膀胱鏡檢查

病人須知 · 用細鏡頭睇你嘅膀胱同尿道

WARWIKI

膀胱鏡檢查 (Cystoscopy) 係醫生用一條細管，前端有鏡頭同燈，經由你天然嘅尿道開口輕輕放入，直接睇到你嘅尿道同膀胱內部。呢個檢查可以幫醫生找出小便有血、感染、狹窄或其他膀胱問題嘅原因，亦可以用嚟跟進術後復原情況。

關於呢個檢查

膀胱鏡係一條前端有鏡頭嘅細管，分兩種：

- **軟式（可彎曲）膀胱鏡**通常喺診所進行，你係清醒嘅，醫生會先塗麻醉凍膏。
- **硬式（直）膀胱鏡**喺手術室進行，你會喺麻醉下入睡，醫生可以同時進行治療。

檢查時會注入無菌液體，令膀胱輕微脹開，方便清楚睇到膀胱壁。醫生可能因以下原因安排呢個檢查：

- 找出**小便有血**或反覆感染嘅原因
- 睇有冇**狹窄 (stricture)**、石或腫塊
- 檢查術後復原情況，或取少量組織（活檢）
- 放置、檢查或取出**支架**或縫線

安唔安全？

安全。膀胱鏡係最常見嘅泌尿科檢查之一，風險低。大部分人只有短暫不適。偶爾出現尿道感染 (UTI)、少量出血或短暫灼痛等副作用，通常輕微，好快消退。

詞彙解釋

膀胱鏡

前端有鏡頭同燈嘅細管，用嚟睇膀胱內部。

膀胱

儲存尿液直至你小便嘅肌肉囊袋。

尿道

將尿液排出體外嘅管道。

軟式 vs. 硬式

軟式係可彎曲嘅鏡（清醒，喺診所）；硬式係直管（麻醉，喺手術室）。

麻醉凍膏

放入尿道嘅局部麻醉劑，令插鏡更舒適。

活檢

取少量組織放喺顯微鏡下化驗。

支架

保持管道暢通嘅軟管，可於檢查時放置或取出。

排尿後殘餘尿量

你小便後膀胱裏面剩低嘅尿液量。

會唔會痛？ 用軟式鏡時，插入嘅時候你可能感到短暫壓迫或刺痛感 — 麻醉凍膏有幫助，診所檢查通常幾分鐘就完成。用硬式鏡時你係麻醉下睡著，過程中完全唔會感覺到任何嘢。如果你感到不適，隨時話畀醫療團隊知。

點樣準備（檢查前）

- 進行診所（軟式）膀胱鏡，通常可以**正常飲食、食藥**，檢查後自己駕車回家。
- 如需**麻醉**，請跟從手術指示 — 包括禁食、暫停某些藥物，並安排人接送。
- 醫生可能要你提供**尿液樣本**以檢查感染，並可能開**抗生素**。

請**提前**告知醫療團隊，如果你：

- 正在服用**薄血藥**
- 有**尿道感染**跡象（灼痛、發燒或尿液混濁、有強烈氣味） — 有活躍感染可能需要改期
- 有任何敏感，或曾試過插鏡困難

檢查過程中會發生咩事

- 1 你舒適咁躺低，醫療團隊幫你擺好姿勢。清潔開口後塗上麻醉凍膏。
- 2 膀胱鏡輕輕經尿道伸入膀胱。
- 3 注入無菌液體脹開膀胱，醫生仔細睇清楚整個膀胱壁。
- 4 取出膀胱鏡。如需治療、活檢或更換支架，會喺取鏡前完成。

之後

- 診所檢查後通常可以**即時恢復日常活動**；麻醉後需要休息並由人接送回家。
- 小便時可能有**短暫灼熱感**，持續一兩天。多飲水有助沖走細菌、減輕不適。
- 小便可能有**輕微淡紅色**，呢個係正常嘅，通常一天內消退。

如果你有以下情況，請即刻聯絡醫療團隊：

- 發燒或發冷
- 排尿困難或完全排唔到尿
- 大量出血或尿液有血塊
- 痛楚愈來愈嚴重

要記住嘅三件事

1. 膀胱鏡係用細鏡頭快速、安全咁睇膀胱同尿道內部，幫助醫生找出問題或確認復原情況。
2. 診所檢查基本上唔需要特別準備；麻醉檢查就要跟禁食指示並安排接送，亦要告知醫生有冇服薄血藥或感染跡象。
3. 輕微灼熱感或尿液輕微帶紅一兩天係正常嘅 — 多飲水，如有發燒、大量出血或排尿困難請即聯絡醫生。