

內窺鏡尿道成形術 (TUITMR)

WARWIKI

病人須知 · 以內窺鏡修復膀胱頸疤痕，毋需外部切口

呢個手術係修復膀胱頸嘅疤痕，或前列腺手術後膀胱與尿道接駁位嘅疤痕。整個過程經內窺鏡完成，毋需外部切口。外科醫生會切開疤痕，再將健康嘅膀胱內膜縫合覆蓋其上，令該處以開放狀態癒合而唔會再收窄。

關於呢個程序

前列腺手術或電療後，**膀胱頸**（即膀胱與尿道嘅接駁位）可能形成疤痕，阻塞尿流。單純切開疤痕往往會再埋口，因為傷口會在疤痕組織上重新癒合。

呢個技術 — **TUITMR**（經尿道切開及橫向黏膜重新對位術）— 係咁解決問題嘅：

- 外科醫生經內窺鏡**切開疤痕**，令管道重新暢通。
- 再用特製**縫合工具**，將健康嘅膀胱內膜縫合覆蓋切口 — 原理似皮瓣修復，但係經尿道完成。

早期結果令人鼓舞：接受一次手術後，約**十分之九**嘅患者管道保持暢通；接受第二次後，幾乎全部成功 — 而且在首批報告中，新發尿失禁嘅風險非常低。

安唔安全？

手術完全經尿道進行，毋需機械臂或開刀手術。早期證據顯示效果令人鼓舞，新發尿失禁嘅風險低（而呢個係其他同類修復術嘅常見風險）。風險包括出血、尿道感染，以及狹窄復發。這係一種較新嘅專科技術。

詞彙解釋

膀胱頸

膀胱收窄連接尿道嘅出口位置。

膀胱頸攣縮

膀胱頸嘅疤痕收窄，阻塞尿流。

吻合口狹窄

前列腺手術後膀胱接駁位嘅疤痕收窄。

尿道

將尿液從身體排出嘅管道。

黏膜（內膜）

覆蓋切口以促進開放癒合嘅健康內層組織。

膀胱鏡

外科醫生操作嘅幼細攝影機。

尿失禁

漏尿 — 呢個技術旨在將此風險保持在低水平。

尿管

癒合期間短暫留置尿道嘅軟管。

會唔會痛？ 手術係麻醉下進行，過程中你唔會有感覺。之後數日可能有輕微灼熱感及尿液帶血。尿管會短暫留置。大多數人同日或短暫留院後即可回家。

點樣準備（手術之前）

- 手術採用**全身麻醉** — 請遵從所有手術指示（禁食，以及需要暫停服用嘅藥物，包括薄血藥）。
- **尿液測試**會先排除感染 — 如有感染須先治療。
- 準備好**短暫留置尿管**，並安排人接送回家。

請**提前告知醫療團隊**，如果你：

- 有服用**薄血藥**，或現時有尿道感染
- 曾做過**前列腺手術、電療**，或此位置嘅其他治療

手術過程中會發生咩事

- 1 你係麻醉下入睡，並會給予抗生素。
- 2 內窺鏡伸至疤痕位置，放入導絲以策安全。
- 3 疤痕被擴張並切開，令管道重新暢通。
- 4 用縫合工具經尿道將健康膀胱內膜推前並縫合覆蓋切口，再留置尿管。

之後

- 你會**同日或短暫留院後**回家，並帶著尿管短暫使用。
- 數日內可能有輕微灼熱感及尿液呈粉紅色，多飲水有幫助。
- 數星期內**避免重體力勞動及用力**。
- 約**4個月**後會安排內窺鏡覆診，確認管道保持暢通。

如果你有以下情況，請即刻聯絡醫療團隊：

- 發燒或畏寒
- 你**無法排尿**，尤其係拔除尿管後
- 新出現嘅嚴重**漏尿**
- 大量出血、血塊，或痛楚加劇

要記住嘅三件事

1. 呢係毋需切口修復膀胱頸疤痕嘅手術 — 疤痕被切開後以健康內膜覆蓋，令其開放癒合，新發漏尿風險低。
2. 準備工作：遵從禁食及藥物指示，先治療任何感染，準備短暫留置尿管，並安排人接送。
3. 數日內有輕微灼熱感及少量粉紅色尿液屬正常，覆診內窺鏡確認效果。如有發燒、無法排尿、新發嚴重漏尿或大量出血，請立即求診。