

迴腸導管手術

WARWIKI

病人須知 · 一種將尿液引流至造口袋嘅泌尿改道手術

迴腸導管手術係喺膀胱切除或膀胱失去功能之後用嚟引流尿液嘅方法。外科醫生會用你自己一小段腸，將腎臟嘅尿液引到腹部一個小開口（造口），尿液會流入你佩戴嘅輕便尿袋。呢個係最簡單、最常見嘅泌尿改道手術。

關於呢個手術

醫生會取出一段約 **15-20 厘米**嘅小腸作為**引流通道** — 呢段腸唔會儲尿。你嘅輸尿管（由腎臟通出嘅管）會接駁喺呢段腸上，然後將其中一端從腹部引出皮膚，形成一個**造口**，通常喺腹部右下方。因為尿液係持續流出嘅，所以你要喺造口上佩戴一個輕便嘅**造口袋**，日間定時倒空，每隔數日更換一次。

- 唔需要控制排尿，亦唔需要自我導尿。
- 其餘腸道會**重新接駁**，消化功能正常繼續。
- **造口護士**會教你點樣護理造口同造口袋。

安唔安全？

迴腸導管手術嘅泌尿改道手術中已有超過 70 年歷史，係最簡單嘅術式，手術時間最短。同任何大手術一樣，有機會出現出血、感染或腸道／輸尿管吻合口漏嘅風險。長期而言，部分人會有造口或皮膚問題、尿道感染 (UTI)，或電解質及維他命變化，定期覆診可及早發現。

詞彙解釋

泌尿改道

膀胱切除或失去功能後，為尿液提供嘅新出路。

迴腸導管

一段短小腸，用嚟將尿液引至造口。

造口

腹部由腸道形成嘅小開口，尿液由此流出。

造口袋

貼喺造口上收集尿液嘅袋子（裝置）。

輸尿管

由腎臟引出尿液嘅管，接駁到導管上。

造口護士

負責標記造口位置及教授造口護理嘅護士。

黏液

腸道分泌嘅滑性液體；尿液中出現黏液絲係正常嘅。

造口周圍皮膚

造口四周嘅皮膚，需要保持清潔及保護。

會唔會痛？ 手術係全身麻醉下進行，過程中你唔會有任何感覺。術後腹部會有酸痛感，腸道亦需要幾日時間「甦醒」（由流質飲食逐漸過渡）。造口本身冇痛覺。大多數人喺醫院逗留約 5-7 日。

點樣準備（手術之前）

- 手術係**全身麻醉**下進行 — 遵從所有手術指示（禁食及暫停指定藥物，包括薄血藥）。你可能需要進行**腸道準備**。
- 事先見造口護士，佢會俾你坐著、站立及躺低時為你標記最佳嘅造口位置 — 呢個步驟對確保造口貼服、防止滲漏非常重要。
- **唔好吸煙** — 吸煙會減慢癒合 — 並預先安排人嚟協助你。

請提早告知醫療團隊，如果你：

- 正在服用**薄血藥**，或者而家有感染
- 有**腸道疾病**（例如克隆氏症或結腸炎），或曾接受腹部手術或放射治療

手術點樣做

- 1 你會係麻醉下入睡，並注射抗生素。
- 2 取出一小段腸，其餘腸道重新接駁。
- 3 將輸尿管接駁到呢段腸上。
- 4 將其中一端引穿腹壁形成造口；放置軟支架及引流管，等待癒合。

之後

- 大約 **5-7 日**後出院。造口護士會教你**倒空造口袋**（每日數次）及**更換裝置**（每隔數日）。
- 尿液中有**黏液**係正常的 — 腸道本身會分泌。
- **多飲水**，並護理好造口周圍皮膚。
- **約六星期內避免搬重物**。你需要終身定期覆診（監測腎功能及維他命 B12）。

如果你有以下情況，請即刻聯絡醫療團隊：

- 發燒或畏寒
- 造口變得**深色、暗啞**或向內縮入
- 造口袋內**幾個小時幾乎冇尿液**
- 嚴重腹痛、嘔吐，或**排唔到氣或大便**（腸道唔通）
- 大量出血，或傷口紅腫或有分泌物

要記住嘅三件事

1. 迴腸導管手術係用一小段腸將尿液引到腹部造口、流入造口袋 — 係最簡單嘅改道手術，唔需要自我導尿。
2. 術前要遵從禁食及腸道準備指示，見造口護士標記造口位置，唔好吸煙，並預早安排人協助。
3. 尿液有黏液係正常嘅，造口護士會教你護理造口袋及皮膚。如有發燒、造口變色、造口袋長時間冇尿，或腹部排唔到氣或大便，請立即致電醫療團隊。