

充氣式陰莖假體 (IPP)

病人須知 · 陰莖植入手術前你需要知道嘅嘢

WARWIKI

充氣式陰莖假體 (IPP) 係一個完全埋喺皮膚底下嘅裝置，可以令你隨時獲得堅挺嘅勃起 — 適合勃起功能障礙 (ED) 嘅男士，喺藥物、注射或其他治療都無效之後使用。你靠陰囊裡面嘅泵控制佢。呢份病人須知解釋裝置點樣運作、點樣準備，同埋手術後會發生咩事。

關於呢個手術

當勃起功能障礙 (ED) 用藥物、真空裝置或注射都無改善，植入假體係最可靠嘅下一步，滿意度好高。三個部件全部埋喺皮膚底下：

- 兩條軟身氣缸放喺陰莖入面，注入液體後會變硬
- 一個泵放喺陰囊，擠壓可充氣，按壓可放氣
- 一個儲液水囊放喺下腹

點樣使用：擠泵幾下令氣缸充液、勃起；按釋放閥令陰莖放軟。你自己決定時間同長短。

重要須知

呢係一個**永久性選擇**。植入假體會改變陰莖海綿體，之後自然勃起同其他 ED 治療（藥物、注射）都唔會再有效 — IPP 就係你唯一嘅勃起方式。但係，佢唔會影響**排尿、感覺、高潮或射精**。同所有植入物一樣，有感染風險，裝置用多年後可能需要更換。

詞彙解釋

勃起功能障礙 (ED)

唔能夠獲得或維持足夠堅挺嘅勃起以進行性行為。

陰莖假體 (IPP)

植入嘅裝置，可以隨你選擇時令陰莖勃起。

氣缸

放喺陰莖入面嘅兩個部件，注入液體後變硬。

泵

放喺陰囊嘅部件，擠壓充氣，按壓放氣。

水囊

放喺下腹嘅儲液容器。

啟動

術後約 4-6 週覆診，首次使用裝置並學習操作。

循環練習

痊癒後每日充放氣 — 保持裝置運作良好並維持陰莖長度。

全身麻醉

令你喺手術期間完全入睡、無痛嘅藥物。

會唔會痛？ 手術係全身麻醉或脊椎麻醉下進行，過程中完全唔會感覺到痛。之後陰莖同陰囊會腫脹、瘀青，持續一兩個星期 — 陰囊托、冰敷同止痛藥可以幫到你。手術約需一個鐘，好多人同日可以返屋企。唔好用裝置，直至醫生為你啟動為止。

點樣準備（手術之前）

- 係全身麻醉或脊椎麻醉下進行 — 跟足所有術前指示（禁食、暫停邊啲藥物，包括薄血藥）。
- **預防感染非常重要：**任何感染（包括尿道感染）都要先處理，你需要用殺菌皂沖涼同服用抗生素。
- **唔好吸煙或用電子煙；**如果你有**糖尿病**，醫療團隊會要求你控制好血糖 — 兩樣都可以降低感染風險。

請提前告知你嘅醫療團隊，如果你：

- 有**糖尿病**，或者手部活動有困難（因為要自己操作泵）
- 曾經做過盆腔或陰莖手術、放射治療，或者之前已有植入物

手術過程

- 1 你會入睡或腰部以下麻木，同時注射抗生素。
- 2 醫生經過一個小切口（喺陰囊附近或下腹），將**氣缸**植入陰莖、**泵**植入陰囊、**水囊**植入下腹 — 全部埋喺皮膚底下。
- 3 裝置經測試後保持放氣狀態等待癒合。可能短暫放置尿管。

之後

- 陰莖同陰囊會腫脹、瘀青約 1-2 個星期。戴陰囊托、冰敷、服止痛藥，保持切口清潔乾爽。
- **未經醫生許可前唔好使用裝置或發生性行為** — 通常需要約**4-6 週**。係啟動覆診時，裝置會首次充氣，你會學習操作泵（放氣需要多啲練習）。
- 之後要**每日充放氣（循環練習）**，持續頭幾個月 — 保持裝置順暢運作並維持長度。

如果你有以下情況，請即刻聯絡醫療團隊：

- 發燒或發冷，或切口附近愈來愈紅、痛、腫，或有分泌物
- 唔能夠排尿
- 痛楚嚴重或加劇，或陰莖變深色或暗啞

要記住嘅三件事

1. IPP 係為未能透過其他治療改善嘅 ED 而設嘅隱藏裝置 — 擠壓陰囊泵勃起，按釋放閥放軟。
2. 呢係一個**永久性選擇**（之後自然勃起同藥物／注射都無效），但唔會影響排尿、感覺、高潮或射精。
3. 預防感染最重要 — 先處理任何感染、唔好吸煙、用殺菌皂同抗生素。啟動（約 4-6 週）之前唔好使用裝置，啟動後每日循環練習。